

Cyclo 3 Fort, 150 mg+150 mg+100 mg kapsułki twarde, 30 szt. (import równoległy, InPharm)



Cena: 28,19 zł

Opis słownikowy

Postać	kapsułki
Producent	Inpharm
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Hesperydyna, Ruszczyk, Witamina C

Opis produktu

Informacje podstawowe Cyclo 3 Fort, 150 mg+150 mg+100 mg kapsułki twarde, 30 szt. (import równoległy, InPharm)

Cyclo 3 Fort to produkt leczniczy, który wpływa na elastyczność naczyń żylnych, o działaniu ochraniającym naczynia krwionośne, do stosowania w niewydolności żylniej (uczucie ciężkich nóg) i pomocniczo w hemoroidach.

Importer: InPharm

Kraj: Grecja

[Kliknij aby dowiedzieć się więcej o produktach z importu równoległego](#)

Skład Cyclo 3 Fort, 150 mg+150 mg+100 mg kapsułki twarde, 30 szt. (import równoległy, InPharm)

Substancjami czynnymi s?: suchy wyci?g z ruszczyka kolczastego (*Ruscus aculeatus* L., *rhizoma*), hesperydyna, kwas askorbowy (witamina C).

1 kapsułka twarda zawiera 150 mg suchego wyciągu z karczyny ruszczyka kolczastego (5 – 7,5 :1), ekstrahent: etanol 85% (v/v); 150 mg hesperydyny metylochalkonu; 100 mg kwasu askorbowego (witaminy C).

Substancje pomocnicze: krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, stearynian magnezu, talk, glikol polioksyetylenowy (Macrogol) 6000; *otoczka kapsułki:* denko (koloru różowego) - barwnik chinolinowa (E 104), barwnik pomarańczowa FCF (E 110), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna; wieczko (koloru pomarańczowego) - barwnik pomarańczowa FCF (E 110), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna.

Działanie Cyclo 3 Fort, 150 mg+150 mg+100 mg kapsułki twarde, 30 szt. (import równoległy, InPharm)

Cyclo 3 Fort zawiera 3 substancje czynne, które wpływają na elastyczność naczyń żylnych. Lek ten działa tonizująco i ochraniająco na naczynia krwionośne (następuje poprawa napięcia ścian naczyń żylnych, odporność naczyń włosowatych, obniża przepuszczalność naczyń krwionośnych).

Wskazania Cyclo 3 Fort, 150 mg+150 mg+100 mg kapsułki twarde, 30 szt. (import równoległy, InPharm)

leczenie objawowe niewydolności naczyń żylnych (uczucie ciężkości w kończynach dolnych, ból),
leczenie pomocnicze w dolegliwościach żyłaków odbytu.

Dawkowanie Cyclo 3 Fort, 150 mg+150 mg+100 mg kapsułki twarde, 30 szt. (import równoległy, InPharm)

<html>
<p style="border: 1px solid #21253d; padding: 5px; color: #21253d; font-family: Lato, sans-serif; line-height: 1.4; font-size: 14px;">Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.</p>
<ul style="border: 1px solid #21253d; padding: 5px; color: #21253d; font-family: Lato, sans-serif; font-size: 14px;">
<li style="border: 1px solid #21253d; padding: 2px 5px 2px 5px;">Lek do stosowania doustnego.
<li style="border: 1px solid #21253d; padding: 2px 5px 2px 5px;">Kapsułki należy stosować ze szklanką wody.
<li style="border: 1px solid #21253d; padding: 2px 5px 2px 5px;">Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.

<p style="border: 1px solid #21253d; padding: 5px; color: #21253d; font-family: Lato, sans-serif; line-height: 1.4; font-size: 14px;">Leczenie objawowe niewydolności naczyń żylnych: 2-3 kapsułki dziennie w schemacie 1 kapsułka rano i 1 kapsułka wieczorem lub 2 kapsułki rano i 1 kapsułka wieczorem.</p>
<p style="border: 1px solid #21253d; padding: 5px; color: #21253d; font-family: Lato, sans-serif; line-height: 1.4; font-size: 14px;"></p>

Leczenie pomocnicze w zylakach odbytu: 4-5 kapsułek dziennie w schemacie 2 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem lub 3 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem.

</html>

Przeciwwskazania Cyclo 3 Fort, 150 mg+150 mg+100 mg kapsułki twarde, 30 szt. (import równoległy, InPharm)

Kiedy nie stosować leku Cyclo 3 Fort:

w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne - wyciąg z ruszczyka, hesperydyny metylochalkon, kwas askorbowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jeśli pacjent ma zaburzenia gospodarki żelazowej (w leku obecny jest kwas askorbowy).

Informacje dodatkowe Cyclo 3 Fort, 150 mg+150 mg+100 mg kapsułki twarde, 30 szt. (import równoległy, InPharm)

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

biegunka,
ból brzucha.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

bezsennaś, niestrawność, mdłości, rumień, świąd, skurcze mięśni, bóle kończyn (rąk / nóg).

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

zawroty głowy, uczucie zimna w kończynach, ból naczyń żylnych (wrażliwość naczyń żylnych), zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wzrost aktywności enzymu wątrobowego (aminotransferazy alaninowej).

Częstość nieznana:

ból żołądka,
pokrzywka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli podczas stosowania pojawi się stan zapalny skóry, owrzodzenia skórne - należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpi obrzęk 1 lub obu kończyn dolnych, niewydolność serca / nerek należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpi biegunka, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

W przypadku stosowania leku w zaburzeniach krążenia żylnego - jeśli po 2 tygodniach pojawił się dyskomfort lub kruchość naczyń, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek zawiera żółcień pomarańczową FCF (E 110), która może powodować reakcje alergiczne.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Lek nie powinien być przyjmowany podczas karmienia piersią.

Wpływ na badania laboratoryjne

Witamina C, czyli kwas askorbowy zawarty w leku może wpływać na niektóre wyniki badań laboratoryjnych jak: oznaczanie glukozy, bilirubiny, aktywności transaminazy, mleczanów etc.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Cyclo 3 Fort przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Producent

INPHARM/PIERRE FABRE