

## Acard, 150 mg tabletki dojelitowe, 30 szt.

Cena: 16,29 zł



### Opis słownikowy

Marka	Acard
Postać	tabletki
Producent	Polfa Warszawa
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Kwas acetylosalicylowy

### Opis produktu

#### Skład Acard, 150 mg tabletki dojelitowe, 30 szt.

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum).

1 tabletki dojelitowa zawiera 150 mg kwas acetylosalicylowego.

Substancje pomocnicze: celuloza proszek, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa, otoczka: hypromeloza, acryl Eze-White: 10, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), talk, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, symetykon emulsja

#### Działanie Acard, 150 mg tabletki dojelitowe, 30 szt.

Lek Acard 150 mg zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się płytek krwi.

#### Wskazania Acard, 150 mg tabletki dojelitowe, 30 szt.

Lek Acard 150 mg przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

#### Dawkowanie Acard, 150 mg tabletki dojelitowe, 30 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Zwykle zaleca się następujące dawkowanie: 1 tabletki na dobę.

W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: jednorazowo 2 tabletki dojelitowe.

Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie.

## Przeciwwskazania Acard, 150 mg tabletki dojelitowe, 30 szt.

Kiedy nie stosować leku Acard 150 mg:

jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;  
jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi;  
jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub), dwunastnicy;  
jeśli pacjent ma ciężkie choroby nerek lub wątroby, lub serca (ciężką niewydolność nerek, wątroby lub serca);  
jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych (objawy ; duszność, świszczący oddech);  
jeśli pacjent ma dnę moczanową;  
jeśli pacjent ma wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (rzadko występująca choroba dziedziczna); , ,  
jeśli pacjent stosuje metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;

## Informacje dodatkowe Acard, 150 mg tabletki dojelitowe, 30 szt.

Nie należy stosować leku Acard 150 mg przez co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym również przed niewielkimi zabiegami np. usunięcie zęba.

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące.

Acard 150 mg zawiera sól.

Lek Acard 150 mg przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.