Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Acard, 150 mg tabletki dojelitowe, 60 szt.

Cena: 18,84 zł

Opis słownikowy

Marka	Acard
Postać	tabletki
Producent	Polfa Warszawa
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Kwas acetylosalicylowy

Opis produktu

Skład Acard, 150 mg tabletki dojelitowe, 60 szt.

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum).

1 tabletka dojelitowa zawiera 150 mg kwas acetylosalicylowego.

Substancje pomocnicze: celuloza proszek, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa, otoczka: hypromeloza, acryl Eze-White: 10, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), talk, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, symetykon emulsja.

Działanie Acard, 150 mg tabletki dojelitowe, 60 szt.

Lek Acard 150 mg zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się płytek krwi.

Wskazania Acard, 150 mg tabletki dojelitowe, 60 szt.

Lek Acard 150 mg przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Dawkowanie Acard, 150 mg tabletki dojelitowe, 60 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Zwykle zaleca się następujące dawkowanie: 1 tabletka na dobę.

W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: jednorazowo 2 tabletki dojelitowe.

Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie.

Przeciwwskazania Acard, 150 mg tabletki dojelitowe, 60 szt.

Kiedy nie stosować leku Acard 150 mg:

jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
jeśli pacjgnt ma zwiększoną skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi;
jeśli pacjent jna chorobę wrzodową żołądka i (lub), dwunastnicy;
jeśli pacjent ma ciężkie choroby nerek lub wątroby, lub serca (ciężką niewydolność nerek,-wątroby lub serca);
jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych (objawy ; duszność, świszczący oddech);
jeśli pacjent ma dnę moczanową;
jeśli pacjent ma wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadko występująca choroba dziedziczna); , ,
jeśli pacjent stosuje metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;

Informacje dodatkowe Acard, 150 mg tabletki dojelitowe, 60 szt.

Nie należy stosować leku Acard 150 mg przez co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym również przed niewielkimi zabiegami np. usunięcie zęba.
Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące.
Acard 150 mg zawiera sód.
Lek Acard 150 mg przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.