

Acard, 75 mg tabletki dojelitowe powlekane, 30 szt.



Cena: 11,29 zł

Opis słownikowy

Marka	Acard
Postać	tabletki
Producent	Polfa Warszawa
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Kwas acetylosalicylowy

Opis produktu

Skład Acard, 75 mg tabletki dojelitowe powlekane, 30 szt.

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum).

1 tabletkę zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.

Substancje pomocnicze: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa, Otoczką: hypromeloza, acryl Eze-White: kopolimer kwasu metakrylowego typ C, talk, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, emulsja antypienna.

Działanie Acard, 75 mg tabletki dojelitowe powlekane, 30 szt.

Lek Acard zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się płytek krwi.

Wskazania Acard, 75 mg tabletki dojelitowe powlekane, 30 szt.

Acard przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Dawkowanie Acard, 75 mg tabletki dojelitowe powlekane, 30 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Zwykle zalecane dawkowanie: 1 tabletkę dziennie. Tabletkę przyjmować po posiłku - połykać w całości, popijając niewielką ilością wody.

W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: jednorazowo 4 tabletki dojelitowe. Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie.

Przeciwwskazania Acard, 75 mg tabletki dojelitowe powlekane, 30 szt.

Kiedy nie stosować leku Acard:

jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek składnik leku;
jeśli u pacjenta stwierdzono skazę krwotoczną;
jeśli u pacjenta stwierdzono czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;
jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek;
jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby;
jeśli u pacjenta wystąpiły napady tzw. astmy aspirynowej i były wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży.

Informacje dodatkowe Acard, 75 mg tabletki dojelitowe powlekane, 30 szt.

Nie należy stosować leku Acard przez co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznych (również przed niewielkimi zabiegami np. usunięcie zęba),

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące.

Acard 75 mg zawiera sól.

Lek Acard 75 mg przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.