Acidolac Baby, proszek, 1,5 g x 10 saszetek

Cena: 37,99 zł

Opis słownikowy

Marka	Acidolac
Postać	proszek
Producent	Medana
Substancja czynna	Fruktooligosacharydy

Opis produktu

Opis Acidolac Baby, proszek, 1,5 g x 10 saszetek

Opis

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.

Acidolac Baby to preparat łączący w składzie szczep bakterii probiotycznych Bifidobacterium BB-12 i fruktooligosacharydy (FOS).

Skład

maltodekstryna, fruktooligosacharydy (FOS), liofilizowany szczep bakterii Bifidobacterium BB-12, substancja przeciwzbryłająca - dwutlenek krzemu.

Wartość odżywcza	w 100 g	w 1 saszetce	w 2 saszetkach
Wartość energetyczna (kJ / kcal)	1620 / 388	24,3 / 5,8	48,6 / 11,6
Białko (g)	0,42	0,006	0,012
Węglowodany (g)	94,5	1,4	2,8
Tłuszcz (g)	<0,1	0	0
Bifidobacterium BB-12	266,6 mld (266,6 x 109 CFU*)	4 mld (4 x 109 CFU*)	8 mld (8 x 109 CFU*)
Fruktooligosaszarydy (FOS) (g)	33	0,5	1

*Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię bakterii

Połączenie składników ułatwia zasiedlanie jelit przez bakterie probiotyczne i wydłuża czas ich przeżycia.

Preparat nie zawiera białka mleka krowiego, laktozy, glutenu i może być podawany osobom, które nie tolerują tych składników.

Właściwości

Acidolac Baby suplement diety, jest naturalnym preparatem zawierającym probiotyczny szczep bakterii mlekowych Bifidobacterium BB-12 oraz prebiotyk – fruktooligosacharydy (FOS).
Połączenie probiotyku z prebiotykiem wydłuża czas przeżycia bakterii probiotycznych i ułatwia kolonizację jelita. Probiotyk wchodzący w skład produktu Acidolac Baby przywraca i pomaga w utrzymaniu prawidłowego składu flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, która stanowi naturalną barierę dla rozwoju niekorzystnej mikroflory.

Przeznaczenie

Przeznaczony do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych.

Przeznaczony do postępowania dietetycznego:

- w stanach zaburzenia równowagi flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, powstałej w trakcie i po antybiotykoterapii,
- w przebiegu biegunek (zwłaszcza infekcyjnych).

Sposób użycia

Preparat przeznaczony do stosowania pod nadzorem lekarza.

Niemowlęta i dzieci: 1-2 saszetki dziennie.

Dla niemowląt zawartość saszetki należy wymieszać z wodą lub mlekiem, a w przypadku dzieci od 2. roku życia i dorosłych produkt może być spożywany również z jogurtem lub bezpośrednio z opakowania.

Stosować w trakcie kuracji antybiotykowej oraz 2-3 tygodnie po jej zakończeniu, lub indywidualnie według wskazań lekarza.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

- Nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Należy zachować ostrożność stosując u dzieci z zaburzeniami odporności lub wrodzoną wadą serca.
- Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.

Może stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeżeli jest spożywany przez osoby, u których nie stwierdzono zaburzeń w stanie zdrowia lub brak jest powyższych wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia produktu.

- Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej 25*C, w sposób niedostępny dla dzieci.