


# Aescin, 20 mg tabletki powlekane, 30 szt. (import równoległy, Delfarma)

Cena: 20,79 zł



## Opis słownikowy

Marka	Aescin
Postać	tabletki
Producent	Delfarma
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Escyna

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Aescin, 20 mg tabletki powlekane, 30 szt. (import równoległy, Delfarma)

Aescin to lek o działaniu przeciwobrzękowym i przeciwzapalnym a także poprawiający stan napięcia naczyń krwionośnych.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej o produktach z importu równoległego

### Skład Aescin, 20 mg tabletki powlekane, 30 szt. (import równoległy, Delfarma)

Substancj? czynn? leku jest alfa-escyna (*Escinum*).

1 tabletki powlekana zawiera 20 mg alfa-escyny.

Substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu stearynian. Otoczk: talk, tytanu dwutlenek (E 171), powidon, polisorbata 80,

kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu metylu, sodu karboksymetyloceluloza, żółcież pomarańczowa (E 110), silikonowa emulsja przeciwpiana.

### **Działanie Aescin, 20 mg tabletki powlekane, 30 szt. (import równoległy, Delfarma)**

Lek Aescin działa przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie oraz poprawia stan napięcia naczyń krwionośnych. Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych. Wykazuje skuteczność w leczeniu obrzęków pooperacyjnych oraz pourazowych. Aescin powoduje szybsze wchłanianie krwiaków pourazowych oraz zmniejsza prawdopodobieństwo ich wystąpienia w okresie pooperacyjnym (szczególnie po zabiegach chirurgicznych narządu ruchu). Ponadto, uszczelniając śródbłonek naczyń krwionośnych poprawia krążenie żyłno-lymfaticzne. Lek stosowany jest również w zapobieganiu zakrzepowemu zapaleniu żył w okresie pooperacyjnym, także w leczeniu zaburzeń krążenia żylnego kończyn i żyłaków kończyn dolnych.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

### **Wskazania Aescin, 20 mg tabletki powlekane, 30 szt. (import równoległy, Delfarma)**

Leczenie przewlekłej niewydolności żylniej, żyłaków kończyn dolnych, żyłaków odbytu.  
Leczenie zapalenia żył kończyn dolnych.  
Profilaktyka i leczenie krwiaków i obrzeków pooperacyjnych i pourazowych.

### **Dawkowanie Aescin, 20 mg tabletki powlekane, 30 szt. (import równoległy, Delfarma)**

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.  
Lek Aescin tabletki powlekane przeznaczony jest do stosowania doustnego.

Zazwyczaj stosowana dawka leku: 3 razy na dobę po 2 tabletki, po posiłku, popijając dużą ilością płynu.

Profilaktycznie można stosować na minimum 16 godzin przed zabiegiem chirurgicznym.  
Po 2-3 miesiącach leczenia można zastosować leczenie podtrzymujące w dawce 40 mg (2 tabletki) 2 razy na dobę.

W przypadku stosowania środków antykoncepcyjnych można przyjmować podwójną dawkę alfa-escyny.

### **Przeciwwskazania Aescin, 20 mg tabletki powlekane, 30 szt. (import równoległy, Delfarma)**

Kiedy nie stosować leku Aescin:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,  
jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,  
u kobiet w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

### **Informacje dodatkowe Aescin, 20 mg tabletki powlekane, 30 szt. (import równoległy, Delfarma)**

#### **Działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

alergiczne zapalenie skóry (świąd, wysypka, rumień, wyprysk, pokrzywka)

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów):  
ciężkie reakcje alergiczne (w niektórych przypadkach z krwawieniem);  
tachykardia,  
nadciśnienie tętnicze;  
reakcje nadwrażliwości;  
krwotok z dróg rodnych.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 1000 pacjentów):  
zawroty głowy, ból głowy;  
nudności, wymioty, biegunka, uczucie dyskomfortu w żołądku.

W przypadku wystąpienia powyższych reakcji, w szczególności krwawienia i pierwszych reakcji nadwrażliwości (wysypka skórna) należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

#### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli po zastosowaniu leku wystąpią:

zapalenie skóry,  
zapalenie zakrzepowe żył,  
podskórne stwardnienia (grudki pod skórą), wrzody skórne, ostry ból związany z dolegliwościami skórnymi,  
nagły obrzęk jednej lub obu nóg,  
niewydolność serca lub nerek.

Istotne jest, aby zastosować się do wszelkich innych nieinwazyjnych środków zalecanych przez lekarza, takich jak bandażowanie nóg, noszenie uciskowych pończoch, okłady z zimnej wody.

Lek zawiera laktozę jednowodną oraz żółcień pomarańczową. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Ze względu na obecność żółcieni pomarańczowej (E 110) lek może powodować reakcje alergiczne.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.  
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### **Stosowanie innych leków**

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Aescin może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych.  
Niektóre antybiotyki – cefalosporyny mogą nasilać działanie leku.  
Należy unikać jednoczesnego podawania leku Aescin z antybiotykami aminoglikozydowymi, ze względu na możliwy wpływ na zwiększone toksyczne działanie aminoglikozydów na nerki.

#### **Ciąża i karmienie piersią**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.  
Ciąża oraz karmienie piersią stanowią przeciwwskazanie do stosowania Aescin.

#### **Stosowanie leku u dzieci i młodzieży**

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Importer: Delfarma  
Kraj: Czechy