

## Almiflux, tabletki do rozgryzania, 20 szt.

Cena: 16,43 zł



### Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	Farmina
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Sorbitol, Węglan wapnia

### Opis produktu

### Informacje podstawowe Almiflux, tabletki do rozgryzania, 20 szt.

Almiflux to wyrób medyczny w postaci tabletek do rozgryzania. Przeznaczony jest dla osób dorosłych zmagających się z problemem refluksu żołądkowo-przelykowego. Almiflux neutralizuje kwasy w żołądku i zapewnia ulgę.

### Skład Almiflux, tabletki do rozgryzania, 20 szt.

Almasilat, odtuszczone mleko w proszku, sorbitol, maltodekstryna, węglan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, powidon K23, talk, stearynian magnezu, sacharynian sodu, aromat karmelowy.

### Działanie Almiflux, tabletki do rozgryzania, 20 szt.

Łagodzi objawy związane z refluksiem żołądkowo-przelykowym np. pieczenie w przełyku (zgaga), zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej do przełyku i gardła, kaszel podrażnieniowy.

Zmniejsza ból i dyskomfort w nadbrzuszu spowodowany nadmiernym wydzielaniem kwasu żołądkowego, m.in. w przebiegu wrzodów żołądka i dwunastnicy.

Neutralizuje kwasu w żołądku, zapewniając ulgę w dolegliwościach związanych z nadmierną kwasowością soków żołądkowych.

## Dawkowanie Almiflux, tabletki do rozgryzania, 20 szt.

Dorośli: Rozgryź i połknij 2 tabletki 3 razy dziennie.

W razie potrzeby popij wodą.

Stosuj po posiłkach lub w razie pojawienia się dolegliwości.

Jeżeli objawy nie ustąpią po 7 dniach, skonsultuj się z lekarzem.

## Przeciwwskazania Almiflux, tabletki do rozgryzania, 20 szt.

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek składnik produktu.

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie zaleca się stosowania preparatu Almiflux u dzieci.

## Informacje dodatkowe Almiflux, tabletki do rozgryzania, 20 szt.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Jeżeli dolegliwości nie ustępują po 7 dniach należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Produkt zawiera laktozę.

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek składnik produktu.

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.