

Altabactin, maść, 20 g

Cena: 15,99 zł



Opis słownikowy

Postać	maść
Producent	Sandoz
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Bacytracyna, Neomycyna

Opis produktu

Opis Altabactin, maść, 20 g

Maści Altabactin nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników leku. Nie należy stosować na duże powierzchnie skóry, zaburzenia czynności serca lub nerek, uszkodzenie narządu słuchu, nie stosować do oczu i na błony śluzowe, nie stosować na rany głębokie lub sączące. Nie należy stosować na ciężkie oparzenia, u dzieci w wieku poniżej 12 lat, w trakcie ciąży i laktacja.

Działanie Altabactin, maść, 20 g

Altabactin maść wykazuje działanie przeciwbakteryjne. Jest to lek wykorzystywany w miejscowym leczeniu bakteryjnych zakażeń na małych obszarach skóry.

Skład Altabactin, maść, 20 g

Substancjami czynnymi są bacytracyna (Bacitracinum) w postaci bacytracyny cynkowej i neomycyna (Neomycinum) w postaci neomycyny siarczanu.

1 gram maści zawiera 250 j.m. bacytracyny w postaci bacytracyny cynkowej i 5mg neomycyny w postaci siarczanu neomycyny.

Substancje pomocnicze: lanolina, parafina ciekła.

Dawkowanie Altabactin, maść, 20 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować od 2 do 3 razy na dobę.

Cienką warstwę maści należy nakładać na chorobowo zmienione miejsce na skórze. W razie potrzeby można przykryć opatrunkiem.

Nie stosować dłużej niż 7 dni.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Informacje dodatkowe Altabactin, maść, 20 g

Uwaga! Nastąpiła zmiana nazwy leku z Baneocin na Altabactin. Skład preparatu nie uległ zmianie.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Galeria

