


Amorolak, 50 mg/ml lakier do paznokci leczniczy, 3 ml (1 butelka)

Cena: 80,89 zł



Opis słownikowy

Postać	lakier
Producent	Sun-Farm
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Amorolfina

Opis produktu

Informacje podstawowe Amorolak, 50 mg/ml lakier do paznokci leczniczy, 3 ml (1 butelka)

Amorolak to produkt leczniczy to stosowania w grzybicy (grzybiczych zakażeń) paznokci.

Skład Amorolak, 50 mg/ml lakier do paznokci leczniczy, 3 ml (1 butelka)

Substancj? czynn? jest: amorolfina.

1 ml lakieru zawiera 50 mg amorolfiny w postaci amorolfiny chlorowodoru.

Substancje pomocnicze: etanol bezwodny, etylu octan, butylu octan, triacetyna, amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A).

Działanie Amorolak, 50 mg/ml lakier do paznokci leczniczy, 3 ml (1 butelka)

Amorolak wykazuje działanie przeciwgrzybicze o szerokim spektrum działania - grzybobójcze i grzybobójcze. Amorolfina działa silnie na: drożdżaki, dermatofity, pleśnie, grzyby dimorficzne.

Wskazania Amorolak, 50 mg/ml lakier do paznokci leczniczy, 3 ml (1 butelka)

grzybicze zakażenia paznokci (grzybica).

Dawkowanie Amorolak, 50 mg/ml lakier do paznokci leczniczy, 3 ml (1 butelka)

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Opakowanie zawiera: 10 szpatulek połączonych razem oraz uchwyt do szpatulki jako urządzenie do aplikacji, 30 pilników do paznokci i 30 gazików.
- **Lakier do paznokci nakłada się na zakażone paznokcie rąk i stóp raz lub dwa razy w tygodniu.**
- Pilników do paznokci stosowanych podczas leczenia nie wolno używać do pielęgnacji zdrowych paznokci, ponieważ zdrowe paznokcie mogłyby zostać zakażone. W celu leczenia zmienionych chorobowo paznokci można na przykład stosować pilniki jednorazowego użytku dołączone do opakowania.
- Warstwa lakieru na paznokciach rąk może zostać starta lub uszkodzona podczas kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi (rozcieńczalniki celulozowe, pochodne terpentyny, itp.). W związku z tym należy zakazać nieprzepuszczalne rękawiczki podczas pracy z tego rodzaju substancjami, aby chronić warstwę lakieru.
- Należy stosować lek nieprzerwanie aż paznokcie zostaną całkowicie wyleczone. Zazwyczaj wymagane jest leczenie trwające sześć miesięcy (w przypadku paznokci rąk) lub dziewięć do dwunastu miesięcy (w przypadku paznokci stóp), w zależności od nasilenia zakażenia.

Podczas stosowania lakieru należy za każdym razem przestrzegać poniższych zaleceń:

- Przed pierwszym nałożeniem lakieru, należy spłukać możliwie jak najwięcej zmienioną chorobowo powierzchnię paznokcia. Przed ponownym użyciem, w miarę potrzeby należy ponownie spłukać paznokcie (np. jeżeli ulegną zgrubieniu). Opakowanie zawiera zestaw pilników do jednorazowego użycia.

- W celu oczyszczenia powierzchni paznokcia, należy zawsze używać jednego z gazików nasączonych alkoholem, dołączonych do opakowania. W ten sposób zostaną usunięte również pozostałości lakieru.
- Lakier do paznokci leczniczy należy nakładać za pomocą jednej z dołączonych szpatulek wielokrotnego użytku. Opakowanie zawiera uchwyt do szpatulki ułatwiający nakładanie lakieru do paznokci. Szpatulkę wielokrotnego użytku należy umieścić w uchwycie do szpatulki.
- Należy nabrać lakier za pomocą jednej z dołączonych szpatulek wielokrotnego użytku. W celu nałożenia lakieru na każdy kolejny zakażony paznokieć, należy za każdym razem zanurzać szpatulkę (niejednolitą powierzchnią), nie wycierając jej o szyjkę butelki (ze względu na ryzyko, że nakrętka przyklei się do butelki).
- Lakier Amorolak należy nałożyć równomiernie na całą powierzchnię zmienionego chorobowo paznokcia przy użyciu szpatulki.
- Specjalny kształt uchwytu do szpatulki zapobiega kontaktowi szpatulki z jakkolwiek powierzchnią (zarodniki grzybów pozostają na szpatulce). Można chwilowo odłożyć szpatulkę, bez obawy że zarodniki grzybów zostaną przeniesione.
- Bezpośrednio po każdym użyciu należy szczelnie zamknąć butelkę, aby zapobiec wysychaniu roztworu. Leczone paznokcie pozostawić do wyschnięcia przez 5 minut.
- Aby szpatulka mogła zostać użyta ponownie, należy po użyciu wyczyścić ją za pomocą gazika naszczonego alkoholem.

Przeciwwskazania Amorolak, 50 mg/ml lakier do paznokci leczniczy, 3 ml (1 butelka)

Kiedy nie stosować leku Amorolak:

w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną (amorolfinę) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Informacje dodatkowe Amorolak, 50 mg/ml lakier do paznokci leczniczy, 3 ml (1 butelka)

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (do 1 na 1000 osób):

zmiany dotyczące paznokci - zmiana zabarwienia, łamliwość, kruchość (objawy te mogą być również efektem grzybicy paznokcia).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (do 1 na 10000 osób):

przemijające, łagodne pieczenie na powierzchni otaczającej leczony paznokieć, swędzenie, zaczerwienienie skóry i pęcherze.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Preparat jest łatwopalny. Należy przechowywać go z dala od ognia i płomieni.

Podczas stosowania należy unikać kontaktu z oczami, uszami, błonami śluzowymi.

Należy unikać malowania paznokci i stosowania sztucznych paznokci podczas leczenia.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Preparatu nie należy stosować u niemowląt i dzieci.