Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

# Anacard Medica Protect, 75 mg tabletki dojelitowe, 60 szt.

Cena: 12,89 zł

## Opis słownikowy

| | |
|---|---|
| Postać | tabletki |
| Producent | Hasco |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | Kwas acetylosalicylowy |

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Anacard Medica Protect, 75 mg tabletki dojelitowe, 60 szt.

Tabletki dojelitowe Anacard Medica Protect to lek zapobiegający zlepianiu się (agregacji) płytek krwi. Lek zawiera kwas acetlosalicylowy i jest przeznaczony do długotrwałego stosowania przy chorobach z ryzykiem zakrzepów i zatorów naczyń krwionośnych. Dzięki formie tabletek dojelitowych, kwas acetylosalicylowy w mniejszym stopniu drażni błonę śluzową żołądka, gdyż uwalnia się dopiero w jelicie.

### Skład Anacard Medica Protect, 75 mg tabletki dojelitowe, 60 szt.

Substancją czynną jest kwas acetylosalicylowy.

1 tabletka zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia żelowana kukurydziana, talk, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 6 171), triacetyna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, trietylu cytrynian, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan.

### Działanie Anacard Medica Protect, 75 mg tabletki dojelitowe, 60 szt.

Działanie Anacard Medica Protect polega na zmniejszaniu zlepianiu się (agregacji) płytek krwi, co zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów oraz zatorów w naczyniach krwionośnych. Zawarty w leku kwas acetylosalicylowy może działać drażniąco na błonę śluzową żołądka, jednak dzięki formie tabletek dojelitowych działanie to jest ograniczone, gdyż rozpadają się one dopiero w jelicie.

Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

## Wskazania Anacard Medica Protect, 75 mg tabletki dojelitowe, 60 szt.

Wskazaniem do zastosowania Anacard Medica Protect jest choroba wieńcowa, inaczej choroba niedokrwienna serca, oraz wszelkie sytuacje kliniczne, gdzie celowe jest ograniczenie agregacji płytek krwi, jak: zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka, świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca, przebyty epizod niestabilnej choroby wieńcowej, prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca, stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej, zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA, u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych, zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów profilaktyki.

## Dawkowanie Anacard Medica Protect, 75 mg tabletki dojelitowe, 60 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się doustnie. Dawkowanie Anacard Medica Protect to zwykle 1 tabletka raz dziennie, połknięta w całości. Wyjątek stanowi świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca, kiedy podaje się 4 tabletki jednorazowo i należy je rozgryźć bardzo dokładnie, aby lek jak najszybciej wchłonął się.

## Przeciwwskazania Anacard Medica Protect, 75 mg tabletki dojelitowe, 60 szt.

Nie stosować Anacard Medica Protect u osób z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest: skaza krwotoczna; czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy; ciężka niewydolność serca lub wątroby albo nerek; występowanie w przeszłości napadów astmy oskrzelowej wywołane przez salicylany lub innych związków o podobnym działaniu, np. NLPZ.

## Informacje dodatkowe Anacard Medica Protect, 75 mg tabletki dojelitowe, 60 szt.

Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego wywołane przez kwas acetylosalicylowy.

Zawarty w leku kwas acetylosalicylowy może wywoływać skurcz oskrzeli oraz napady astmy oskrzelowej czy inne reakcje nadwrażliwości. Na tego typu reakcje szczególnie narażeni są pacjenci z: astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, polipami błony śluzowej nosa, katarem siennym jak również osoby z reakcjami nadwrażliwości na inne substancje (jak świąd, pokrzywka).

Przed zabiegami chirurgicznymi, w tym usunięciem zęba, należy poinformować lekarza o stosowaniu Anacard Medica Protect. W przypadku planowanych zabiegów należy odstawić lek 5 dni wcześniej.

Nawet małe ilości kwasu acetylosalicylowego zmniejszają wydalanie kwasu moczowego, więc w przypadku pacjentów ze skłonnością do takiego typu problemów, Anacard Medica Protect może wywołać atak dny moczanowej.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.