Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Anaftin, żel na afty, 8 ml

Cena: 22,29 zł

Opis słownikowy

Marka	Anaftin
Postać	żel
Producent	Berlin Chemie
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Aloes, Glikol propylenowy, Kwas hialuronowy, Olej rycynowy

Opis produktu

Informacje podstawowe Anaftin, żel na afty, 8 ml

Anaftin® Żel polecany do leczenia niewielkich ran w jamie ustnej.

Skład Anaftin, żel na afty, 8 ml

Poliwinylopirolidon (PVP), maltodekstryna, glikol propylenowy, PEG-40, olej rycynowy uwodorniony, guma ksantanowa, sorbinian potasu, benzoesan sodu, hialuronian sodu, aromat, chlorek benzalkonium, wersenian disodu (EDTA), sacharynian sodu, dwupotasowa sól kwasu glicyryzynowego, aloes zwyczajny (Aloe barbadensis), woda.

Działanie Anaftin, żel na afty, 8 ml

Anaftin® Żel zawiera poliwinylopirolidon (PVP) i kwas hialuronowy, które tworzą ochronną warstwę pokrywającą jamę ustną, stanowiącą barierę mechaniczną dla uszkodzonych okolic i dzięki temu łagodzi ból wywołany podrażnieniem odsłoniętych zakończeń nerwowych. Zawarte w składzie kwas hialuronowy i aloes wspomagają naturalny proces gojenia uszkodzonych tkanek.

Wskazania Anaftin, żel na afty, 8 ml

Anaftin® Żel łagodzi dolegliwości bólowe wywołane przez niewielkie zmiany w jamie ustnej, takie jak aftowe zapalenie jamy ustnej, owrzodzenia aftowe, jak również zmiany wywołane przez aparaty ortodontyczne i źle' dopasowane protezy. Jest również wskazany do stosowania w przypadku rozległych owrzodzeń aftowych.

Dawkowanie Anaftin, żel na afty, 8 ml

Nałóż 1 lub 2 krople żelu na okolicę owrzodzenia lub zmiany. Unikaj bezpośredniego kontaktu aplikatora ze zmianą. Nie dotykaj zmiany językiem przez co najmniej 2 minuty, aby mogła utworzyć się warstwa ochronna. Zakręć tubkę po każdym użyciu.
Dla uzyskania najlepszych rezultatów unikaj jedzenia i picia przez co najmniej 1 godzinę po użyciu.

Stosuj 3-4 razy dziennie lub częściej, jeśli to konieczne.

Informacje dodatkowe Anaftin, żel na afty, 8 ml

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Każda tubka produktu Anaftin® Żel powinna być używana tylko przez jednego pacjenta, aby uniknąć zanieczyszczenia aplikatora i żelu.
Stosowanie produktu Anaftin® Żel jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników
W przypadku częstych nawrotów owrzodzeń jamy ustnej wskazana jest konsultacja lekarska.

Uwagi
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.