Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Apap Caps, 500 mg kapsułki miękkie, 10 szt.

Cena: 10,19 zł



Opis słownikowy

Marka	Apap
Postać	kapsułki
Producent	Us Pharmacia
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Paracetamol

Opis produktu

Informacje podstawowe Apap Caps, 500 mg kapsułki miękkie, 10 szt.

Apap Caps to produkt leczniczy do stosowania w leczeniu łagodnego do umiarkowanego bólu lub/i gorączki. Lek Apap Caps wykazuje działanie przeciwbólowe.

Skład Apap Caps, 500 mg kapsułki miękkie, 10 szt.

Substancją czynną leku jest paracetamol.

1 kapsułka miękka zawiera 500 mg paracetamolu.

Substancje pomocnicze to: zawartość kapsułki: makrogol 400, makrogol 600, woda oczyszczona, glikol propylenowy, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna. osłonka kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, woda oczyszczona, glicerol, tytanu dwutlenek (E171).

Zawiera śladowe ilości alkoholu izopropylowego, triglicerydów nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, lecytyny sojowej.

Działanie Apap Caps, 500 mg kapsułki miękkie, 10 szt.

APAP Caps zawiera substancję czynną paracetamol. Paracetamol należy do grupy leków zwanych analgetykami (leków przeciwbólowych).

Wskazania Apap Caps, 500 mg kapsułki miękkie, 10 szt.

Lek APAP Caps stosuje się w leczeniu objawowym łagodnego do umiarkowanego bólu i (lub) gorączki.

Lek APAP Caps można stosować u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej lat 9.

Dawkowanie Apap Caps, 500 mg kapsułki miękkie, 10 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kapsułkę należy połknąć popijając dużą ilością wody (pół szklanki).

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat (masa ciała >55 kg): 1 lub 2 kapsułki (500 mg -1g) jednorazowo, maksymalnie 6 kapsułek (3 g) na dobę.

Dzieci w wieku od 9 do 12 lat (30 - 40 kg): 1 kapsułka (500 mg) jednorazowo, 3 - 4 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 12 do 15 lat (40 - 55 kg): 1 kapsułka (500 mg) jednorazowo, 4 - 6 razy na dobę.

Mniejsza częstość podawania jest przeznaczona dla młodszych dzieci w danej grupie wiekowej. U dzieci w wieku poniżej 12 lat nie należy stosować dawki większej niż 60 mg/kg mc./dobę.

Jeżeli ból utrzymuje się dłużej niż przez 5 dni lub gorączka przez dłużej niż 3 dni lub te objawy nasilają się lub wystąpią inne objawy, stosowanie leku należy przerwać i skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania Apap Caps, 500 mg kapsułki miękkie, 10 szt.

Kiedy nie stosować leku APAP Caps:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Informacje dodatkowe Apap Caps, 500 mg kapsułki miękkie, 10 szt.

APAP Caps zawiera lecytynę sojową. Jeśli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soję nie może stosować tego leku.
Lek APAP Caps zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.
Przed rozpoczęciem stosowania leku APAP Caps należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek;
jeśli pacjent ma zespół Gilberta;
jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy 6-fosforanowej;
jeśli pacjent ma anemię hemolityczną;
jeśli pacjent jest odwodniony;
jeśli pacjent jest chronicznie niedożywiony;
jeśli pacjent ma astmę i jest uczulony na aspirynę (kwas acetylosalicylowy)
Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.