

Apipulmol, syrop, 120 ml



Cena: 14,49 zł

Opis słownikowy

Postać	syrop
Producent	Farmina
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Sulfogwajakol

Opis produktu

Informacje podstawowe Apipulmol, syrop, 120 ml

Wykazuje działanie wykrztuśne i rozluźniające wydzielinę zalegającą w drzewie oskrzelowym.

Skład Apipulmol, syrop, 120 ml

10 ml syropu zawiera 260 mg sulfogwajakolu potasowego oraz 12 mg amonowego chlorku oraz substancje pomocnicze: ziołomiód sosnowy, parahydroksybenzoesan metylu, alkohol etylowy, woda oczyszczona.

Działanie Apipulmol, syrop, 120 ml

Zmniejsza lepkość śluzu i ułatwia jego przesuwanie w oskrzelach poprzez aktywizację czynności rzęsków nabłonka migawkowego.

Wskazania Apipulmol, syrop, 120 ml

Stany zapalne górnych dróg oddechowych, kaszel.

Dawkowanie Apipulmol, syrop, 120 ml

Dorośli doustnie 3-4 razy dziennie po 1 łyżeczce stołowej (10 ml) syropu.

Przeciwwskazania Apipulmol, syrop, 120 ml

Uczulenie na produkty pszczele.

Nie stosować w okresie ciąży, karmienia piersią oraz u dzieci.

Informacje dodatkowe Apipulmol, syrop, 120 ml

Działania niepożądane

Nie zaobserwowano objawów niepożądanych. Pojedyncze przypadki działania przeczyszczającego.

Interakcje:

W przypadku zastosowania syropu Apipulmol na zlecenie lekarza, należy poinformować o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

Środki ostrożności:

Pacjenci, którzy po zastosowaniu zaobserwowali niepokojące objawy (np. działanie przeczyszczające) powinni odstawić syrop i skontaktować się z lekarzem.

Syrop zawiera ziołomiód sosnowy. W 10 ml syropu znajduje się ok. 7,5 g cukrów prostych.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Syrop zawiera parahydroksybenzoesan metylu. Może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli.

Lek Apipulmol zawiera małe ilości etanolu (alkoholu). W dawce 10 ml syropu znajduje się 33 mg czystego alkoholu etylowego, co odpowiada 2,75 ml wina lub 6,6 ml piwa.

Prowadzenie pojazdów:

Zachować ostrożność, gdy chodzi o prowadzenie pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ciąża:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Uwagi:

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Lek nie wymaga specjalnych środków ostrożności przy przechowywaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.