


## Artelac, krople do oczu, 10 ml (import równoległy, Delfarma)



Cena: 18,29 pln

### Opis słownikowy

Marka	Artelac
Postać	krople
Producent	Delfarma
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Hypromeloza

### Opis produktu

### Informacje podstawowe Artelac, krople do oczu, 10 ml (import równoległy, Delfarma)

Artelac to produkt leczniczy w postaci nawilżających kropli do oczu o zwiększonej lepkości.

Kraj pochodzenia: Niemcy

### Skład Artelac, krople do oczu, 10 ml (import równoległy, Delfarma)

Substancją czynną jest hypromeloza (Hypromellosem).

1 ml roztworu zawiera 3,2 mg hypromelozy.

Substancje pomocnicze: cetrymid, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, sodu wodorofosforan dwunastowodny, sorbitol, woda do wstrzykiwań.

### Działanie Artelac, krople do oczu, 10 ml (import równoległy, Delfarma)

Krople **Artelac** z hypromelozą mają dużą lepkość dzięki czemu dobrze przylegają do powierzchni spojówek i rogówki oka, zapewniając odpowiednie nawilżenie. W przypadku zbyt małej ilości płynu łzowego podanie kropli zapobiega podrażnieniu i nadmiernemu wysuszeniu powierzchni oka.

## Wskazania Artelac, krople do oczu, 10 ml (import równoległy, Delfarma)

**Artelac** jest stosowany w objawowym leczeniu zespołu suchego oka. Suche oko może wystąpić w przypadku upośledzenia wydzielania płynu łzowego lub kiedy nie można całkowicie lub częściowo zamknąć powiek.

Lek może być również używany do nawilżania twardych soczewek kontaktowych.

## Dawkowanie Artelac, krople do oczu, 10 ml (import równoległy, Delfarma)

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leczenie zespołu suchego oka wymaga indywidualnego dawkowania.

W zależności od ciężkości i nasilenia objawów zwykle wkrapla się jedną kroplę do worka spojówkowego 3 do 5 razy na dobę, lub częściej, w zależności od potrzeb.

- Należy skonsultować się z lekarzem okulistą w razie długotrwałego lub ciągłego leczenia lekiem Artelac.
- Lek może służyć także do zwilżania twardych soczewek kontaktowych.
- Należy się zapoznać z instrukcją aplikacji kropli do oczu (zawarta w ulotce).

## Przeciwwskazania Artelac, krople do oczu, 10 ml (import równoległy, Delfarma)

Kiedy nie stosować leku **Artelac**:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

## Informacje dodatkowe Artelac, krople do oczu, 10 ml (import równoległy, Delfarma)

### Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane (częstość występowania nie została ustalona):

- przekrwienie spojówek,
- podrażnienie oka,
- ból oka,
- świąd oka,
- pieczenie oka,
- zaczerwienienie oka,
- uczucie obecności ciała obcego,
- nadmierne łzawienie,
- sklejanie powiek,
- zaburzenia widzenia,
- nadwrażliwość,
- świąd,
- wysypka.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Należy usunąć soczewki kontaktowe przed podaniem leku i nie zakładać ich wcześniej, niż po upływie około 15 minut.
- Artelac krótko po podaniu może zaburzać ostrość widzenia.
- Jeśli wystąpią lub nasilą się objawy podrażnienia oczu, ból oczu, zaczerwienienie oczu, problemy z widzeniem należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem okulistą.
- Jeśli objawy zespołu suchego oka utrzymują się lub nasilają się, stosowanie leku należy skonsultować z lekarzem.

- Lek Artelac zawiera cetrymid jako substancję konserwującą. Może ona powodować podrażnienie oka oraz uszkodzenie nabłonka rogówki, zwłaszcza gdy lek jest stosowany długotrwale.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki – 6 tygodni.  
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

#### **Stosowanie innych leków**

Należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych wydawanych bez recepty.

Jeśli Artelac jest stosowany z innymi lekami okulistycznymi, należy zachować 15-minutową przerwę pomiędzy zastosowaniem leków. Lek Artelac należy zawsze podawać jako ostatni, po upływie 15 minut po podaniu innego leku.

#### **Ciąża i karmienie piersią**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Artelac nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba, że lekarz zdecyduje inaczej

#### **Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn**

Artelac krótko po podaniu może zaburzać ostrość widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn tak długo, jak długo zaburzona jest ostrość widzenia.