

AulinDol, żel 0,03 g/g, 50 g

Cena: 13,35 zł



Opis słownikowy

Postać	żel
Producent	Angelini
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Nimesulid

W leczeniu bólu
przy skręceniu stawów i przy
urazowym zapaleniu ścięgien

LEK
żel 50 g

AD/farol/03/22

Opis produktu

Informacje podstawowe AulinDol, żel 0,03 g/g, 50 g

Żel z nimesulidem do objawowego leczenia bólu związanego ze skręceniem stawów i ostrym urazowym zapaleniem ścięgien.

Skład AulinDol, żel 0,03 g/g, 50 g

Substancją czynną leku jest **nimesulid**. 1 g żelu zawiera 30 mg nimesulidu.

Pozostałe składniki to: glikolu dietylenowego monoetylowy eter, makrogolglycerydów kaprylokaproniany, karbomery, disodu edetynian, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), trietanolamina i woda oczyszczona.

Postać farmaceutyczna: żel.

Działanie AulinDol, żel 0,03 g/g, 50 g

AulinDol to żel przeciwbólowy stosowany do objawowego leczenia bólu przy skręceniu stawów i przy ostrych urazach ścięgien. Lek AulinDol zawiera substancję czynną nimesulid, należącą do niesteroidowych leków o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym (NLPZ).

Wskazania AulinDol, żel 0,03 g/g, 50 g

AulinDol jest stosowany w celu łagodzenia bólu spowodowanego:

- skręczeniami stawów,

- urazami ścięgien zwanymi „ostrymi urazowymi zapaleniami ścięgien”.
- AulinDol to żel z nimesulidem do stosowania miejscowego. Lek nie zawiera alkoholu.

Dawkowanie AulinDol, żel 0,03 g/g, 50 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Potrzebna ilość żelu zależy od rozmiarów bolesnego lub obrzękniętego miejsca.

- Zazwyczaj stosuje się 3 g żelu (co odpowiada 6 – 7 cm żelu wyciśniętego z tubki).
- Stosować żel 2 lub 3 razy na dobę.
- Lek stosować od 7 do 15 dni. Jeżeli objawy nie ulegną poprawie po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia dalszego postępowania.
- W przypadku wątpliwości dotyczącej ilości leku jaką należy użyć, zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób stosowania

Wmasować lek w bolesne i obrzęknięte miejsce. Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

- Nie stosować doustnie. W przypadku przypadkowego połknięcia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.
 - Nie stosować na uszkodzoną skórę, na rany, otarcia lub na stany zapalne skóry.
 - Nie stosować żelu w okolice oczu. W razie kontaktu leku z oczami należy je przemyć czystą wodą.
 - Nie stosować żadnych kremów czy maści na leczony obszar skóry. Mogą one uniemożliwiać prawidłowe działanie leku.
 - Nie narażać na działanie promieni słonecznych leczonej powierzchni skóry.
 - Może wystąpić zwiększona skłonność do oparzeń słonecznych.
 - Nie stosować pod opatrunki wodoodporne lub nieprzepuszczające powietrza.
 - Lek AulinDol może brudzić na żółto leczoną skórę, a także ubrania stykające się z leczonym obszarem.
- W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania AulinDol, żel 0,03 g/g, 50 g

Kiedy nie stosować leku AulinDol:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (nimesulid) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub na inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NPLZ),
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Nie stosować leku AulinDol jeśli którakolwiek z opisanych powyżej sytuacji dotyczy pacjenta.

W razie wątpliwości przed zastosowaniem tego leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku AulinDol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli pacjent choruje na astmę,
- jeśli u pacjenta występują poważne zaburzenia wątroby, nerek lub serca,
- jeśli u pacjenta występuje krwawienie z żołądka lub owrzodzenie żołądka,
- jeśli u pacjenta występują problemy z krzepiwością krwi,
- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Dzieci i młodzież

Leku AulinDol nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek AulinDol a inne leki

W związku z tym, że AulinDol jest stosowany zewnętrznym, nie są znane ani spodziewane interakcje z innymi lekami, podawanymi ogólnie. Nie stosować na skórę z innymi lekami podawanymi miejscowo.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku AulinDol u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Lek AulinDol zawiera:

Metylu parahydroksybenzoesan (E 218) i propylu parahydroksybenzoesan (E 216). Mogą one powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Te reakcje mogą pojawić się natychmiast lub po kilku dniach.

Informacje dodatkowe AulinDol, żel 0,03 g/g, 50 g

Żel AulinDol – jak przechowywać?

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować leku AulinDol po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i tekturowym pudełku po Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Za każdym razem bezpośrednio po użyciu leku należy zamknąć tubę zakrętką.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu: 14 dni.
- Nr serii jest zamieszczony po słowie Lot.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Galeria



AulinDol
Nimesulidum

- żel z nimesulidem do stosowania miejscowego
- ma działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe*
- lepszy efekt kosmetyczny – nie zawiera alkoholu*

*Charakterystyka produktu leczniczego AulinDol AD7000322



AulinDol
Nimesulidum

Jeden lek dla wielu...
w leczeniu bólu związanego ze skręceniem stawów i urazowym zapaleniem ścięgien.

AulinDol
50 mg/g, żel Żel 50 g

Lek OTC AD7000322



AulinDol
Nimesulidum

Dawkowanie i sposób podawania u dorosłych

6 7
Odmierzyć dawkę żelu (zazwyczaj 3g, co odpowiada 6-7cm wyciśniętego żelu)

Nałożyć cienką warstwę żelu na bolące miejsce, wcierając do całkowitego wchłonięcia

Powtórzyć 2-3 razy na dobę

Czas trwania leczenia: 7 do 15 dni

AD7000322



AulinDol
Nimesulidum

Dostępne dwie wielkości opakowania: 50 g i 100 g

AulinDol
50 mg/g, żel Żel 100 g

AulinDol
50 mg/g, żel Żel 50 g

AD7000322