

Avenalax, czopki glicerolowe, 1 g x 10 szt. Avena



Cena: 6,48 zł

Opis słownikowy

Marka	Avenalax
Postać	czopki
Producent	Farmina
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Gliceryna

Opis produktu

Informacje podstawowe Avenalax, czopki glicerolowe, 1 g x 10 szt. Avena

Avenalax to lek w postaci czopków doodbytniczych, który stosuje się w zaparciach jako środek o działaniu łagodnie przeczyszczającym. Lek o masie 1 g jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Skład Avenalax, czopki glicerolowe, 1 g x 10 szt. Avena

Substancją czynną jest glicerol (Glycerolum).

1 czopek zawiera 86% glicerolu.

Substancje pomocnicze: kwas stearynowy, bezwodny węglan sodu.

Działanie Avenalax, czopki glicerolowe, 1 g x 10 szt. Avena

Czopki Avenalax po rozpuszczeniu w jelicie grubym powodują jego delikatne podrażnienie. W ten sposób stymulują jelito do pracy. Dodatkowo działają jako środek poślizgowy, ułatwiając przesuwanie się mas kałowych.

Wskazania Avenalax, czopki glicerolowe, 1 g x 10 szt. Avena

Czopki Avenalax przeznaczone są do stosowania u dzieci w przypadku krótkotrwałych zaparć.

Dawkowanie Avenalax, czopki glicerolowe, 1 g x 10 szt. Avena

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doodbytniczego.

Efekt przeczyszczający następuje po 15-60 minutach od zastosowania.

Przed zastosowaniem czopka należy wyjść z opakowania.

Wiek	Dawkowanie
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat	jednorazowo 1 lub 2 czopki na noc
Dzieci w wieku od 1 do 3 lat	jednorazowo pół czopka (wzdłuż przekrojonego) na noc
Dzieci poniżej 1. roku życia	stosować po konsultacji z lekarzem

Przeciwwskazania Avenalax, czopki glicerolowe, 1 g x 10 szt. Avena

Nie należy stosować leku w przypadku: uczulenia na którykolwiek ze składników tego leku; choroby nowotworowej odbytnicy; ostrej niewydolności nerek; zapalenia wyrostka robaczkowego i innych stanów zapalnych w obrębie jamy brzusznej.

Informacje dodatkowe Avenalax, czopki glicerolowe, 1 g x 10 szt. Avena

Lek należy stosować doraźnie.

Nie stosować przez dłuższy okres czasu oraz w przypadku, gdy mimo podania czopka u dziecka utrzymuje się zaparcie, należy wtedy skonsultować się z lekarzem.

Lek należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

U dzieci poniżej 1 roku życia czopki należy stosować po konsultacji z lekarzem.