

Axoviral, 50 mg/ g krem, 10 g

Cena: 7,17 zł



Opis słownikowy

Postać	krem
Producent	Axxon
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Acyklowir

Opis produktu

Skład Axoviral, 50 mg/ g krem, 10 g

Substancją czynną leku jest acyklowir (1g zawiera 50mg acyklowiru). Pozostałe składniki to: alkohol cetostearylowy, parafina ciekła, glikol propylenowy, sodu laurylosiarczan, poloksamer 407, wazelina biała i woda oczyszczona.

Działanie Axoviral, 50 mg/ g krem, 10 g

Przeciwwirusowe, wykazująca silne działanie na wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Wskazania Axoviral, 50 mg/ g krem, 10 g

W miejscowym leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy, wywołanej przez wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Dawkowanie Axoviral, 50 mg/ g krem, 10 g

Nakładać na chorobowo zmienione miejsca na skórze 5 razy na dobę w odstępach około czterogodzinnych, z przerwą nocną. Lek działa najskuteczniej, jeśli leczenie rozpoczyna się jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki, jak np. pieczenie, swędzenie lub zaczerwienienie. Leczenie można również rozpocząć w późniejszym okresie choroby, gdy wystąpią grudki lub pęcherzyki. Leczenie prowadzić co najmniej przez 4 dni. Jeśli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych, leczenie przedłużyć do 10 dni.

Przeciwwskazania Axoviral, 50 mg/ g krem, 10 g

Jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować na błony śluzowe np. ust, nosa lub oczu oraz w leczeniu opryszczki narządów płciowych.