

Bebiko 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca proszek, 800 g



Cena: 47,89 zł

Opis słownikowy

Marka	Bebiko
Postać	proszek
Producent	Nutricia
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina

Opis produktu

Opis Bebiko 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca proszek, 800 g

Opis

Mleko następne dla niemowląt po 6. miesiącu.

Skład

laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, oleje roślinne, galaktooligosacharydy z mleka (8,24%), polifruktoza (0,58%), węglan wapnia, chlorek potasu, chlorek choliny, kwas L-askorbinowy, tauryna, lecytyna sojowa, L-askorbinian sodu, siarczan żelazawy, L-tryptofan, inozytol, octan DL-alfa-tokoferolu, L-izoleucyna, sól sodowa 5'-monofosforanu urydyny, siarczan cynku, 5'-monofosforan cytydyny, chlorowodorek L-cysteiny, 5'-monofosforan adenozy, sól sodowa 5'-monofosforanu inozy, nikotynamid, sól sodowa 5'-monofosforanu guanozyny, L-karnityna, D-pantotenian wapnia, kwas foliowy, siarczan miedzi, palmitynian retinolu, DL-alfa-tokoferol, D-biotyna, chlorowodorek tiaminy, cholekalcyferol, cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, siarczan manganu, jodek potasu, fitomenadion, selenin sodu

100 ml Bebiko 2 = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki = 285 kJ (68 kcal)

1 płaska miareczka = 4,9 g = 95 kJ (23 kcal)

Zawiera mieszaninę prebiotyków (galaktooligosacharydy i polifruktoza: 0,8 g / 100 ml).

Wartość odżywcza	100 g proszku	100 ml produktu gotowego do spożycia
Wartość energetyczna	1950 kJ / 465 kcal	285 kJ / 68 kcal
Białko	9,3 g	1,4 g
Węglowodany, w tym:	59 g	8,6 g
laktoza	56,5 g	8,3 g
glukoza	1,6 g	0,2 g
Tłuszcz, w tym kwasy tłuszczowe:	20,5 g	3,0 g
nasycone	9,1 g	1,3 g
jednonienasycone	8,0 g	1,2 g
wielonienasycone	3,4 g	0,5 g
kwas linolowy	2780 mg	406 mg
kwas α-linolenowy	515 mg	75 mg
Błonnik pokarmowy	3,9 g	0,6 g
Sód	120 mg	17 mg
Potas	527 mg	77 mg
Chlorki	372 mg	54 mg
Wapń	469 mg	68 mg
Fosfor	255 mg	37 mg
Magnez	31 mg	4,5 mg
Żelazo	7 mg	1 mg
Cynk	3,9 mg	0,57 mg
Miedź	282 mcg	41 mcg
Mangan	48 mcg	7,0 mcg
Selen	11 mcg	1,6 mcg
Jod	92 mcg	13 mcg
Fluor	<20 mcg	<3 mcg
Witamina A	459 mcg ER	67 mcg ER
Witamina D3	10 mcg	1,5 mcg
Witamina E	8,0 mg α-ET	1,2 mg α-ET
Witamina K1	35 mcg	5,1 mcg
Tiamina (wit. B1)	381 mcg	56 mcg
Ryboflawina (wit. B2)	609 mcg	89 mcg
Niacyna	3,1 mg	0,45 mg
Kwas pantotenowy	2374 mcg	347 mcg
Witamina B6	294 mcg	43 mcg
Kwas foliowy	85 mcg	12 mcg
Witamina B12	0,92 mcg	0,13mcg
Biotyna	10 mcg	1,5 mcg
Witamina C	65 mg	9,5 mg
Nukleotydy	22 mg	3,2 mg
L-karnityna	6,5 mg	0,95 mg
Cholina	69 mg	10 mg
Inozytol	25 mg	3,7 mg
Tauryna	36 mg	5,3 mg

Produkt bezglutenowy.

Właściwości

Bebiko 2 zostało opracowane tak, aby dostarczało niezbędnych składników odżywczych i energii, których potrzebuje dziecko w drugim półroczu życia.

Wspiera zdrowy rozwój dziecka dzięki zawartości:

- wapnia i witaminy D dla mocnych kości,
- żelaza ważnego dla rozwoju mózgu,
- opatentowanej kompozycji prebiotyków NUTRICIA (w tym błonnika) dla zdrowej flory bakteryjnej w jelitach, która jest częścią zdrowego układu trawiennego.

Przeznaczenie

Produkt jest odpowiedni wyłącznie dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia.

Bebiko 2 może być zarówno samodzielnym posiłkiem, jak też służyć do przygotowania kleików i bezmlecznych kaszek BoboVita oraz innych mlecznych posiłków, np. kakao, budyniu, płatków z mlekiem, naleśników itp.

Sposób użycia

Tabela żywienia Bebiko 2 (o ile lekarz nie zaleci inaczej):

Wiek niemowlęcia 7. miesiąc i powyżej

Ilość porcji na dobę 3

Woda (ml) 210

Ilość płaskich miareczek na porcję 7

Sposób przygotowania mleka bez gotowania

1. Umyj ręce, wyparz miareczkę oraz wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut lub użyj sterylizatora.
2. Gotuj wodę pitną przez 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury ok. 40°C.
3. Sprawdź tabelę żywienia i wlej dokładną ilość wody do butelki. Nie używaj powtórnie gotowanej wody.
4. Zawsze używaj wyłącznie załączonej miareczki.
5. Dodaj dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek Bebiko 2.
6. Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż smoczek na butelkę.
7. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni.

Bebiko 2 powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem. Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części mleka.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Zaleca się, aby zmiana karmienia niemowlęcia (np. przejście z karmienia piersią na karmienie butelką lub zmiana mleka na kolejny etap) nie następowała gwałtownie. Należy stopniowo zwiększać ilość mleka modyfikowanego dodawanego do mleka matki lub powoli zmniejszać ilość proszku obecnie używanego mleka, zwiększając ilość proszku nowego mleka.

Produkt powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety niemowlęcia. Decyzję dotyczącą rozpoczęcia wprowadzania pokarmów uzupełniających, zwłaszcza poniżej 6. miesiąca życia, należy podjąć po konsultacji z lekarzem, uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie niemowlęcia. Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Po skończonym karmieniu nie należy pozostawiać smoczka z resztką mleka w buzi dziecka.

Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

Po każdym użyciu foliowa torebka powinna być szczelnie zamknięta.

- Zawartość otwartego opakowania foliowego powinna być zużyta w ciągu 1 miesiąca.
- Opakowanie przed i po otwarciu powinno być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.
- Nie przechowywać w lodówce.