

Bebiko ExtraCare HA 1, hipoalergiczne mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, 350 g



Cena: 33,09 zł

Opis słownikowy

Marka	Bebiko
Postać	proszek
Producent	Nutricia
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina

Opis produktu

Informacje podstawowe Bebiko ExtraCare HA 1, hipoalergiczne mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, 350 g

Bebiko HA1 Nutriflor Extracare, proszek, 350 g, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla niemowląt od urodzenia do 6. miesiąca życia, narażonych na ryzyko wystąpienia alergii na białko mleka krowiego. Zawiera częściowo zhydrolizowane białka serwatkowe, mniej alergenne od zwykłych białek mleka. Pozwala na ograniczenie ryzyka wystąpienia alergii na białka mleka. Nie nadaje się dla dzieci z już stwierdzoną alergią na białka mleka.

UWAGA: Seria mlek specjalistycznych Bebiko Nutriflor Extracare zastępuje serię mlek specjalistycznych Bebiko z Nutriflor+. To nowe opakowanie i udoskonalony skład produktu pochodzącego od uznanego producenta pokarmów dla niemowląt i małych dzieci. Mleko Bebiko Nutriflor+ będzie dostępne do wyczerpania zapasów. Pamiętaj, że każdą zmianę pokarmu dla niemowlęcia i małego dziecka należy przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość starego, a zwiększając ilość nowego pokarmu.

Skład Bebiko ExtraCare HA 1, hipoalergiczne mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, 350 g

Koncentrat zhydrolizowanego białka serwatkowego **z mleka**, laktoza **z mleka**,

galaktooligosacharydy z mleka (8,78 %), skrobia, olej palmowy, olej rzepakowy, olej kokosowy, olej s?onecznikowy, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów t?uszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym), fruktooligosacharydy (0,62 %), potas, wap?, olej z Mortierella alpina, olej rybi, chlorek choliny, witamina C, emulgator (lecytyny z soi), tauryna, inozytol, ?elazo, cynk, sól sodowa kwasu urydyno-5'- fosforowego, kwas cytydino-5'-monofosforowy, witamina E, kwas adenozyno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5'- fosforowego, L-karnityna, niacyna, sól sodowa kwasu guanozyno-5'-fosforowego, kwas pantotenowy, biotyna, mied?, kwas foliowy, witamina A, ryboflawina, tiamina, witamina D, witamina B6, mangan, jod, witamina K, selen.

Sk?adniki od?ywcze	100 ml produktu gotowego do spo?ycia
Warto?? energetyczna	275 kJ (66 kcal)
T?uszcz, w tym	3,4 g
kwasy t?uszczowe nasycone	1,6 g
kwasy t?uszczowe jednonienasycone	1,2 g
kwasy t?uszczowe wielonienasycone	0,5 g
W?glowodany, w tym	7,2 g
cukry	6,1 g
B?onnik	0,6 g
Bia?ko	1,5 g
Sól	0,06 g
Witaminy:	
Witamina A	50 µg
Witamina D	1,2 µg
Witamina E	1 mg
Witamina K	4,4 µg
Witamina C	9,1 mg
Tiamina	0,05 mg
Ryboflawina	0,1 mg
Niacyna	0,43 mg
Witamina B6	0,04 mg
Kwas foliowy	8,4 µg
Witamina B12	0,16 µg

Biotyna	1,8 µg
Kwas pantotenowy	0,35 mg
Składniki mineralne:	
Sód	25 mg
Potas	73 mg
Chlorek	41 mg
Wapń	46 mg
Fosfor	26 mg
Magnez	5,1 mg
Cynk	0,53 mg
Miedź	0,5 mg
Mangan	0,04 mg
Fluorek	0,01 mg
Selen	<0,01 mg
Jod	1,5 µg
Inne:	
Cholina	12 µg
Inozytol	10 mg
L-karnityna	4,1 mg
Nukleotydy	1 mg
Kwas dokozaheksaenowy (DHA)	3,2 mg
	6,4 mg

Produkt zawiera mleko, soję i ryby.

Działanie Bebiko ExtraCare HA 1, hipoalergiczne mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, 350 g

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Bebiko HA1 Nutriflor Extracare zawiera hipoalergiczne, hydrolizowane białko serwatkowe. Dzięki hydrolizie, czyli pocięciu na mniejsze fragmenty, cząsteczki białka tracą w dużym stopniu swoje alergenne właściwości, opatentowaną mieszankę składników o charakterze błonnika GOS/FOS 9:1 (galaktooligosacharydy i fruktooligosacharydy). Zawiera również LCPUFA – długołańcuchowe, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, w tym kwas dokozaheksaenowy DHA (Omega 3) oraz witaminy i składniki mineralne w proporcjach odpowiednich do wymagań organizmu niemowlęcia.

Wskazania Bebiko ExtraCare HA 1, hipoalergiczne mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, 350 g

Bebiko HA1 Nutriflor Extracare to hipoalergiczne mleko początkowe przeznaczone dla zdrowych niemowląt, które nie mogą być karmione piersią, a są narażone na ryzyko wystąpienia alergii na białko mleka krowiego. Są to niemowlęta, których rodzeństwo lub przynajmniej jedno z rodziców jest alergikiem.

Dawkowanie Bebiko ExtraCare HA 1, hipoalergiczne mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, 350 g

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Bebiko HA1 Nutriflor Extracare należy zawsze przygotowywać dokładnie tak, jak opisuje to instrukcja na opakowaniu.

Skrócona instrukcja przygotowania:

Umyj ręce, wyparz miareczkę oraz wygotuj butelkę i smoczek we wrzątku przez 10 minut, lub zdezynfekuj przy użyciu sterylizatora.

Gotuj wodę pitną przez 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury około 40oC.

Sprawdź tabelę żywienia i wlej dokładną ilość wody do butelki.

Dodaj dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek proszku Bebiko 1. Zawsze używaj wyłącznie oryginalnej, załączonej miareczki!

Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku.

Założ smoczek na butelkę.

Przed podaniem pokarmu, zawsze sprawdź jego temperaturę, wylewając kilka kropli na wewnętrzną stronę nadgarstka.

Pokarm należy wykorzystać bezpośrednio po przygotowaniu, najpóźniej w ciągu 2 godzin od przygotowania.

Informacje dodatkowe Bebiko ExtraCare HA 1, hipoalergiczne mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, 350 g

Bebiko HA1 Nutriflor Extracare stosuj w porozumieniu z lekarzem.

Bebiko HA1 Nutriflor Extracare nie powinno być stosowane w diecie niemowląt, u których stwierdzono alergię na białko mleka krowiego.

Wprowadzenie podstawowego mleka początkowego przed mlekiem hipoalergicznym może obniżyć jego skuteczność.

Bebiko HA1 Nutriflor Extracare powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem.

Należy wykorzystać w ciągu dwóch godzin po przygotowaniu.

Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części mleka.

Po skończonym karmieniu nie należy pozostawiać smoczka z resztką mleka w buzi dziecka.

Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

Po każdym użyciu foliowa torebka powinna być szczelnie zamknięta.

Zawartość otwartego opakowania foliowego powinna być zużyta w ciągu 1 miesiąca.

Opakowanie przed i po otwarciu powinno być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce.

Nie zaleca się przesywywania mleka do innych pojemników.

Mleko modyfikowane dla niemowląt nie powinno być podgrzewane w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem.