

Bebiko ExtraCare HA 2, hipoalergiczne mleko następne powyżej 6 miesiąca, 350 g



Cena: 28,89 zł

Opis słownikowy

Marka	Bebiko
Postać	proszek
Producent	Nutricia
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina

Opis produktu

Informacje podstawowe Bebiko ExtraCare HA 2, hipoalergiczne mleko następne powyżej 6 miesiąca, 350 g

Mleko hipoalergiczne dla niemowląt od 7. do 12. miesiąca życia, narażonych na ryzyko wystąpienia alergii na białko mleka krowiego, karmionych wcześniej mlekiem Bebiko HA1 Nutriflor Extracare. Zawiera częściowo zhydrolizowane białka serwatkowe, mniej alergenne od zwykłych białek mleka. Pozwala na ograniczenie ryzyka wystąpienia alergii na białka mleka. Nie nadaje się dla dzieci z już stwierdzoną alergią na białka mleka.

Uwaga: Seria mlek specjalistycznych Bebiko Nutriflor Extracare zastępuje serię mlek specjalistycznych Bebiko z Nutriflor+. To nowe opakowanie i udoskonalony skład produktu pochodzącego od uznanego producenta pokarmów dla niemowląt i małych dzieci. Mleko Bebiko Nutriflor+ będzie dostępne do wyczerpania zapasów. Pamiętaj, że każdą zmianę pokarmu dla niemowlęcia i małego dziecka należy przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość starego, a zwiększając ilość nowego pokarmu.

Skład Bebiko ExtraCare HA 2, hipoalergiczne mleko następne powyżej 6 miesiąca, 350 g

Koncentrat zhydrolizowanego białka serwatkowego z **mleka**, laktoza z **mleka**, skrobia, galaktooligosacharydy z **mleka** (8,12 %), olej palmowy, olej rzepakowy, olej kokosowy, olej słonecznikowy, fruktooligosacharydy (0,57 %), emulgator (mono- i

diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym), potas, wapń, olej rybi, olej z *Mortierella alpina*, chlorek choliny, witamina C, tauryna, emulgator (lecytyny z soi), żelazo, witamina E, cynk, inozytol, sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, kwas cytydino-5'-monofosforowy, kwas adenozylo-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozylo-5'-fosforowego, L-karnityna, niacyna, sól sodowa kwasu guanozylo-5'-fosforowego, kwas pantotenowy, biotyna, miedź, witamina A, kwas foliowy, ryboflawina, tiamina, witamina D, witamina B6, jod, mangan, witamina K, selen.

Składniki odżywcze	100 ml produktu gotowego do spożycia
Wartość energetyczna	285 kJ (68 kcal)
Tłuszcz, w tym	3,0 g
kwasów tłuszczowych nasyconych	1,4 g
kwasów tłuszczowych jednonienasyconych	1,1 g
kwasów tłuszczowych wielonienasyconych	0,5 g
Węglowodany, w tym:	8,4 g
cukry	6,9 g
Białko	0,6 g
Białko	1,6 g
Sól	0,06 g
Witaminy:	
Witamina A	60 µg
Witamina D	1,4 µg
Witamina E	1,1 mg
Witamina K	5,1 µg
Witamina C	9,5 mg
Tiamina	0,05 mg
Ryboflawina	0,12 mg
Niacyna	0,45 mg
Witamina B6	0,04 mg
Kwas foliowy	8,5 µg
Witamina B12	0,17 µg
Biotyna	1,8 µg

Kwas pantotenowy	0,35 mg
Składniki mineralne:	
Sód	25 mg
Potas	78 mg
Chlorek	43 mg
Wapń	62 mg
Fosfor	35 mg
Magnez	5,4 mg
Żelazo	1,1 mg
Cynk	0,54 mg
Miedź	0,04 mg
Mangan	0,01 mg
Fluorek	<0,01 mg
Selen	1,5 µg
Jod	13 µg
Inne:	
Cholina	10 mg
Inozytol	3,4 mg
L-karnityna	1,0 mg
Nukleotydy	3,3 mg
Kwas dokozaheksaenowy (DHA)	5,7 mg

Produkt zawiera mleko (niezawiera laktozy), ryby i soję.

Działanie Bebiko ExtraCare HA 2, hipoalergiczne mleko następne powyżej 6 miesiąca, 350 g

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Bebiko HA2 Nutriflor Extracare zawiera:

Częściowo hydrolizowane białko serwatkowe. Dzięki hydrolizie, czyli pocięciu na mniejsze fragmenty, cząsteczki białka tracą w pewnym stopniu swoje alergenne właściwości,

Opatentowaną mieszankę składników o charakterze błonnika GOS/FOS 9:1 (galaktooligosacharydy i fruktooligosacharydy),
LCPUFA – długołańcuchowe, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, w tym kwas dokozaheksaenowy DHA (Omega 3),
Wapń i witaminę D, niezbędne dla prawidłowego rozwoju zdrowego układu kostnego.

Wskazania Bebiko ExtraCare HA 2, hipoalergiczne mleko następne powyżej 6 miesiąca, 350 g

Bebiko HA2 Nutriflor Extracare to mleko następne, przeznaczone dla niemowląt po 6. miesiącu życia. Dzięki odpowiedniemu procesowi technologicznemu mleko Bebiko HA2 Nutriflor Extracare zawiera częściowo zhydrolizowane białko, dlatego może być podawane

niemowlętom karmionym wcześniej mlekiem Bebiko HA1 Nutriflor Extracare.

Dawkowanie Bebiko ExtraCare HA 2, hipoalergiczne mleko następne powyżej 6 miesiąca, 350 g

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Bebiko HA2 Nutriflor Extracare należy zawsze przygotowywać dokładnie tak, jak opisuje to instrukcja na opakowaniu.

Skrócona instrukcja przygotowania:

Umyj ręce, wyparz miareczkę oraz wygotuj butelkę i smoczek we wrzątku przez 10 minut, lub zdezynfekuj przy użyciu sterylizatora.

Gotuj wodę pitną przez 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury około 40°C.

Sprawdź tabelę żywienia i wlej dokładną ilość wody do butelki.

Dodaj dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek proszku Bebiko 1. Zawsze używaj wyłącznie oryginalnej, załączonej miareczki!

Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku.

Załącz smoczek na butelkę.

Przed podaniem pokarmu, zawsze sprawdź jego temperaturę, wylewając kilka kropli na wewnętrzną stronę nadgarstka.

Pokarm należy wykorzystać bezpośrednio po przygotowaniu, najpóźniej w ciągu 2 godzin od przygotowania.

Informacje dodatkowe Bebiko ExtraCare HA 2, hipoalergiczne mleko następne powyżej 6 miesiąca, 350 g

Bebiko HA2 Nutriflor Extracare stosuj w porozumieniu z lekarzem.

Bebiko HA2 Nutriflor Extracare stanowi tylko część odpowiednio zbilansowanej diety niemowląt po 6. miesiącu życia.

Bebiko HA2 Nutriflor Extracare powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem.

Należy wykorzystać w ciągu dwóch godzin po przygotowaniu.

Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części mleka.

Po skończonym karmieniu nie należy pozostawiać smoczka z resztką mleka w buzi dziecka.

Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

Po każdym użyciu foliowa torebka powinna być szczelnie zamknięta.

Zawartość otwartego opakowania foliowego powinna być zużyta w ciągu 1 miesiąca.

Opakowanie przed i po otwarciu powinno być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce.

Nie zaleca się przesypania mleka do innych pojemników.

Mleko modyfikowane dla niemowląt nie powinno być podgrzewane w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem.