

Bebilon Pepti MCT, preparat mlekozastępczy od urodzenia proszek, 450 g



Cena: 52,89 zł

Opis słownikowy

Marka	Bebilon
Postać	proszek
Producent	Nutricia
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina

Opis produktu

Informacje podstawowe Bebilon Pepti MCT, preparat mlekozastępczy od urodzenia proszek, 450 g

Bebilon® Pepti MCT™ Nutricia to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego odpowiednia do stosowania u niemowląt od urodzenia. Preparat w proszku przeznaczony jest do postępowania dietetycznego w przypadku alergii na białka mleka krowiego i/lub zaburzeń trawienia i wchłaniania. Formuła jest odpowiednia do podawania także noworodkom z niską masą urodzeniową. Preparat Bebilon® Pepti MCT™ zawiera średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe MCT (ang. medium-chain triglycerides) oraz białka poddane hydrolizie znacznego stopnia.

Skład Bebilon Pepti MCT, preparat mlekozastępczy od urodzenia proszek, 450 g

Syrop glukozowy w proszku, koncentrat hydrolizowanego białka serwatkowego z **mleka**, trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT), oleje roślinne (rzepakowy, słonecznikowy, palmowy, z organizmów jednokomórkowych), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym - emulgator, fosforan

wapnia, dwuwodorofosforan potasowy, chlorek potasu, w?glan wapnia, olej **rybi**, chlorek choliny, chlorek sodu, chlorek magnezu, kwas L-askorbinowy, tauryna, L-askorbinian sodu, inozytol, siarczan ?elaza, octan DL-alfa-tokoferolu, siarczan cynku, L-karnityna, sól sodowa 5'-monofosforanu urydyny, 5'-monofosforan cytydyny, 5'-monofosforan adenozyiny, sól sodowa 5'-monofosforanu inozyiny, nikotynamid, D-pantotenian wapnia, sól sodowa 5'-monofosforanu guanozyiny, D-biotyna, siarczan miedzi, kwas foliowy, palmitynian retinylu, ryboflawina, DL-alfa-tokoferol, siarczan manganu, cyjanokobalamina, chlorowodorek tiaminy, cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, jodek potasu, fitomenadion, selenin sodu.

Warto?ci od?ywcze	100 g proszku	100 ml gotowego produktu
Warto?? energetyczna	2155 kJ (515 kcal)	275 kJ (66 kcal)
T?uszcz, w tym:	27,3 g	3,5 g
- kwasy nasycone	15 g	1,9 g
- kwasy jednonienasycone	6,2 g	0,8 g
- kwasy wielonienasycone	4,4 g	0,6 g
W?glowodany, w tym:	53,4 g	6,8 g
- cukry	8,2 g	1 g
B?onnik	0 g	0 g
Bia?ko	14 g	1,8 g
Sól	0,35 g	0,05 g
Witaminy:		
Witamina A	405 µg	52 µg
Witamina D	9,8 µg	1,3 µg
Witamina E	9,7 mg	1,2 mg
Witamina K	37 µg	4,7 µg
Witamina C	73 mg	9,3 mg
Tiamina	0,39 mg	0,05 mg
Ryboflawina	0,77 mg	0,1 mg
Niacyna	3,4 mg	0,43 mg
Witamina B6	0,31 mg	0,04 mg
Kwas foliowy	70 µg	8,9 µg
Witamina B12	1,4 µg	0,18 µg

Biotyna	13 µg	1,7 µg
Kwas pantotenowy	2,58 mg	0,33 mg
Składniki mineralne:		
Sód	140 mg	18 mg
Potas	507 mg	65 mg
Chlorek	310 mg	40 mg
Wap?	390 mg	50 mg
Fosfor	218 mg	28 mg
Magnez	40 mg	5,1 mg
?elazo	6 mg	0,77 mg
Cynk	3,9 mg	0,5 mg
Mied?	0,31 mg	0,04 mg
Mangan	0,24 mg	0,03 mg
Selen	14 µg	1,8 µg
Jod	93 µg	12 µg
Inne:		
Laktoza	0,5 g	0,06 g
Nukleotydy	25 mg	3,2 mg
L-karnityna	8,3 mg	1,1 mg
Cholina	79 mg	10 mg
Inozytol	26 mg	3,3 mg
Tauryna	41 mg	5,3 mg
Trójglicerydy ?rednio?a?cuchowe (MCT)	12,6 g	1,6 g
Kwas dokozaheksaenowy (DHA)	52 mg	6,7 mg
Osmolarno??	-	190 mOsmol/l

Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody + 3 paskie miarki produktu = 275 kJ (66 kcal)
1 paska miarka = 4,3 g proszku.

Produkt zawiera mleko i ryby.

Działanie Bebilon Pepti MCT, preparat mlekozastępczy od urodzenia proszek, 450 g

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego **Bebilon pepti MCT** zawiera:

- Trójglicerydy nienasycone MCT (z ang. **Medium Chain Triglycerides**),
- Białko hydrolizowane w znacznym stopniu (czyli pocięte na mniejsze cząstki i wolne aminokwasy), dzięki czemu jest dobrze tolerowane przez większość dzieci z alergią na białko mleka krowiego,
- Dodatek kwasu dokozaheksaenowego (DHA) - długołańcuchowego wielonienasyconego kwasu tłuszczowego (LCPUFA), z grupy omega 3 w ilości 0,2% kwasów tłuszczowych ogółem,
- Nukleotydy witaminy i składniki mineralne,
- Produkt nie zawiera składników modyfikowanych genetycznie (GMO) - podobnie jak wszystkie inne produkty dla niemowląt i małych dzieci na rynku polskim.

Wskazania Bebilon Pepti MCT, preparat mlekozastępczy od urodzenia proszek, 450 g

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Bebilon pepti MCT jest przeznaczony dla niemowląt od urodzenia, do postępowania dietetycznego w przypadku:

Przewlekłych biegunek opornych na leczenie,
Alergii na białko pokarmowe, w tym białko mleka krowiego,
Przejścia z żywienia pozajelitowego na żywienie naturalne,
Niedoboru disacharydaz,
Resekcji jelita,
Żywienia przez zabiegami i po zabiegach operacyjnych w obrębie przewodu pokarmowego (dieta bezresztkowa),
Zespołów złego wchłaniania: stolce tłuszczowe (zaburzenia trawienia i/lub wchłaniania tłuszczów), zaburzenia trawienia i/lub wchłaniania białek,
Mukowiscydozy,
Hipoproteinemii (zaawansowane niedobory białkowo-energetyczne).

Dawkowanie Bebilon Pepti MCT, preparat mlekozastępczy od urodzenia proszek, 450 g

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Bebilon pepti MCT powinien być stosowany pod nadzorem i według zaleceń lekarza, po rozważeniu wszystkich innych metod żywienia, w tym karmienia piersią.

Mleko modyfikowane należy przygotowywać zawsze ściśle przestrzegając wskazówek producenta, umieszczonych na opakowaniu. Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć złe konsekwencje dla zdrowia dziecka. Skrócona instrukcja przygotowania:

Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia na opakowaniu. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki. Używaj wyłącznie załączonej miareczki. Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek mleka Bebilon. Dodaj odmierzoną ilość proszku do butelki. Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni.

Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

Przeciwwskazania Babilon Pepti MCT, preparat mlekozastępczy od urodzenia proszek, 450 g

Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części pokarmu.
Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników.
Nie podgrzewać roztworu w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem.
Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku bądź niczego innego do przygotowywanego preparatu.
Nie przechowywać w lodówce.
Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego

Informacje dodatkowe Babilon Pepti MCT, preparat mlekozastępczy od urodzenia proszek, 450 g

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Częściowe lub całkowite zastąpienie mleka matki mlekiem modyfikowanym lub preparatem mlekozastępczym powinno być uzgodnione z lekarzem pediatrą.
Preparat Babilon Pepti MCT powinien być wykorzystany w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.
Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.
Zaleca się, aby do odmierzenia odpowiedniej porcji proszku używać wyłącznie miarki dołączonej do opakowania.
Należy zwrócić uwagę na higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu.
Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
Produkt, przed użyciem i po otwarciu, powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C.
Zawartość opakowania powinna być zużyta w ciągu 4 tygodni po otwarciu.
Opakowanie 450 g proszku Babilon® Pepti MCT™ zawiera 33 porcje o pojemności 100 ml.