

Bebilon Prosyneo HA 3 Hydrolyzed Advance, mleko powyżej 1 roku proszek, 400 g



Cena: 41,45 zł

Opis słownikowy

Marka	Bebilon
Postać	proszek
Producent	Nutricia
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina

Opis produktu

Informacje podstawowe Bebilon Prosyneo HA 3 Hydrolyzed Advance, mleko powyżej 1 roku proszek, 400 g

Bebilon Prosyneo HA 3 Hydrolyzed Advance mleko modyfikowane w proszku to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, odpowiednie od 1. roku życia. Formuła mleka została ulepszona o zwiększoną zawartość kwasu dokosaheksaenowego (DHA) z grupy omega 3 oraz niektórych witamin i składników mineralnych. *

*Zgodnie z przepisami prawa Bebilon Prosyneo™ HA3 zawiera: witaminy C i D dla prawidłowego funkcjonowanie układu odpornościowego.

Skład Bebilon Prosyneo HA 3 Hydrolyzed Advance, mleko powyżej 1 roku proszek, 400 g

Laktoza z mleka, hydrolizat białka serwatki z mleka, oleje roślinne (wysokooleinowy sojowy, kokosowy, rzepakowy, słonecznikowy), galaktooligosacharydy z mleka 9,2 %, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym, lecytyny), wapń, fruktooligosacharydy 0,6 %, olej rybi, potas,

magnez, chlorek choliny, sól, olej z *Mortierella alpina*, witamina C, inozytol, tauryna, ?elazo, *Bifidobacterium breve M-16V*, L-karnityna, cynk, nukleotydy (kwas cytydino-5'-monofosforowy, sól sodowa kwasu urydino-5'-fosforowego, kwas adenozylo-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozylo-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozylo-5'-fosforowego), przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, witamina E, miedź, witamina A, ryboflawina, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

Wartość odżywcza	100 ml gotowego do spożycia mleka	% RVD
Wartość energetyczna	272/65 kJ/kcal	-
Tłuszcz w tym	3,2 g	-
kwas tłuszczowy nasycone	1,1 g	-
kwas tłuszczowy jednonienasycone	1,5 g	-
kwas tłuszczowy wielonienasycone	0,5 g	-
Węglowodany w tym	7,3 g	-
cukry	7,2 g	-
Błonnik	0,5 g	-
Białko	1,5 g	-
Sól	0,08 g	-
Witaminy		
Witamina A	57 µg	14 %
Witamina D	1,62 µg	23 %
Witamina E	1,2 mg	24 %
Witamina K	4,2 µg	35 %
Witamina C	9,5 mg	21 %
Tiamina	0,05 mg	10 %
Ryboflawina	0,13 mg	19 %
Niacyna	0,44 mg	-
Witamina B6	0,039 mg	-
Kwas foliowy	9,4 µg	8 %
Witamina B12	0,19 µg	24 %
Biotyna	1,4 µg	14 %
Kwas pantotenowy	0,5 mg	17 %

Składniki mineralne		
Potas	87 mg	9 %
Chlorek	49 mg	10 %
Wapń	69 mg	13 %
Fosfor	39 mg	-
Magnez	6,9 mg	9 %
Żelazo	0,97 mg	12 %
Cynk	0,48 mg	10 %
Miedź	0,051 mg	10 %
Mangan	0,005 mg	-
Fluorek	0,004 mg	-
Selen	3,7 µg	19 %
Jod	12 µg	15 %
Inne		
kwasy tłuszczowe nienasycone (ALA)	48,8 mg	-
Galaktooligosacharydy/Fruktooligosacharydy (9:1)	0,74 g	-

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Działanie Bebilon Prosyneo HA 3 Hydrolyzed Advance, mleko powyżej 1 roku proszek, 400 g

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Bebilon Prosyneo HA zawiera opracowane naukowo składniki mające na celu zmniejszenie ryzyka rozwoju alergii na białka mleka krowiego. Formuła, która łączy kompozycję Syneo i unikalną strukturę zhydrolizowanego białka delikatnie pociętą na mniejsze fragmenty, posiada kompozycję oligosacharydów GOS/FOS galakto- i fruktooligosacharydów oraz Bifidobacterium Breve będącą jedną z bakterii naturalnie występujących w jelitach niemowląt. Posiada nukleotydy, kwas α-linolenowy ALA (omega 3) oraz kwas dokozaheksaenowy DHA (omega 3), którego ilość została zwiększona w ulepszonej recepturze. Zawiera także witaminy A, C, D oraz cynk dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.*

*Zgodnie z przepisami prawa Bebilon Prosyneo™ HA3 zawiera: witaminy C i D dla prawidłowego funkcjonowanie układu odpornościowego.

Wskazania Bebilon Prosyneo HA 3 Hydrolyzed Advance, mleko powyżej 1 roku proszek, 400 g

Mleko modyfikowane w postaci proszku jest mlekiem następnym przeznaczonym dla dzieci wyłączone powyżej 1. roku życia. Powinno stanowić tylko część zróżnicowanej diety dziecka.

Dawkowanie Bebilon Prosyneo HA 3 Hydrolyzed Advance, mleko powyżej 1 roku proszek, 400 g

Wiek dziecka	Liczba porcji na dobę	Woda (ml) na 1 porcję	Liczba płaskich miarek na 1 porcję
powyżej 1. roku życia	2	180	6

Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody + 3 płaskie miarki produktu = 272 kJ (65 kcal). 1 płaska miarka to 4,6 g.

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka. Zalecane dzienne spożycie mleka po 1. roku życia to 400-500 ml.

Sposób użycia

Mleko modyfikowane należy przygotowywać zawsze ściśle przestrzegając wskazówek producenta, umieszczonych na opakowaniu. Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć złe konsekwencje dla zdrowia dziecka. Skrócona instrukcja przygotowania:

Przed przygotowaniem mleka umyj dokładnie ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka. Następnie po przegotowaniu przez 5 minut świeżą wodę pitną pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia na opakowaniu. Wlej odpowiednią ilość przegotowanej ciepłej wody do przygotowanego naczynia. Do odmierzania proszku stosuj załączoną miarkę. Dodaj odmierzoną ilość proszku do butelki, płaskich, nieubitych miareczek. Wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia proszku. Sprawdź temperaturę mleka.

Przeciwwskazania Bebilon Prosyneo HA 3 Hydrolyzed Advance, mleko powyżej 1 roku proszek, 400 g

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Informacje dodatkowe Bebilon Prosyneo HA 3 Hydrolyzed Advance, mleko powyżej 1 roku proszek, 400 g

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Częściowe lub całkowite zastąpienie mleka matki mlekiem modyfikowanym powinno być uzgodnione z lekarzem.

Mleko Bebilon Prosyneo HA nie powinno być stosowane przy stwierdzonej alergii na białka mleka krowiego. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

Mleko powinno być wykorzystane w ciągu 2 godzin od przygotowania, nie należy używać ponownie niewykorzystanej części pokarmu.

Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ponieważ może zawierać ważne informacje. Nie zaleca się także przesypywania do innych pojemników. Zawartość opakowania powinna być zużyta w ciągu 4 tygodni po otwarciu.

Nie należy podgrzewać mleka modyfikowanego w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem.

Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku oraz innych produktów do przygotowywanego mleka.

Zaleca się, aby do odmierzenia odpowiedniej porcji mleka używać wyłącznie miarki dołączonej do opakowania.

Należy zwrócić uwagę na higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu.

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Produkt, przed użyciem i po otwarciu, powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C. Nie należy przechowywać w lodówce.

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Galeria

