


Biflorin Elektrolity, proszek saszetki, 10 szt.

Cena: 12,99 zł



Opis słownikowy

Marka	Biflorin
Postać	proszek
Producent	Puwer
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Chlorek sodu, Cytrynian sodu, Elektrolity, Glukoza, Potas

Opis produktu

Informacje podstawowe Biflorin Elektrolity, proszek saszetki, 10 szt.

Biflorin Elektrolity - to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosowana w przypadku biegunek, wymiotów w celu uzupełnienia utraconych elektrolitów.
Smak truskawkowy.

Skład Biflorin Elektrolity, proszek saszetki, 10 szt.

Glukoza, cytrynian sodu, chlorek potasu, chlorek sodu, naturalny aromat, truskawka zag?szczony sok proszek, substancja s?odz?ca: sacharyny.

Sk?adnik	[mmol/litr]	100 g [mg]	1 saszetka [mg]	100 ml produktu przygotowanego zgodnie z instrukcj?

Glukoza	90	67 500	2700	1627
Sód	65	6150	246	148
Potas	25	3950	158	95
Chlorki	53	7775	311	187
Cytrynian	12	9450	378	228
Osmolarno?? [mOsm/litr]	254	-	-	-

Warto?? od?ywacza i energetyczna	100 g	100 ml produktu przygotowanego zgodnie z instrukcją
Warto?? energetyczna	1304 kJ/307 kcal	26 kJ/ 6 kcal
T?uszcz, w tym:	0 g	0 g
kwasy t?uszczowe nasycone	0 g	0 g
W?glowodany, w tym:	70 g	1,4 g
cukry	68 g	1,4 g
Bia?ko	0 g	0 g
B?onnik	0 g	0 g
Sól	15,6 g	0, 31 g

Wskazania Biflorin Elektrolity, proszek saszetki, 10 szt.

Do podstępowania dietetycznego w trakcie biegunki, wymiotów w celu uzupełnienia elektrolitów i zapobiegnięciu odwodnieniu.

Dawkowanie Biflorin Elektrolity, proszek saszetki, 10 szt.

Zawartość 1 saszetki należy rozpuścić w ok. 170 ml chłodnej wody (3 saszetki w ok. 500 ml wody), nie dosładzać roztworu. Pić małe porcje co 5 minut. Dzieciom można podawać roztwór z butelki. Zaleca się spożycie do 5 saszetek (1000 ml) w ciągu pierwszych 4 godzin.

W kolejnym etapie nawadniania bądź w trakcie profilaktycznego postępowania, żeby nie dopuścić do odwodnienia, należy podawać porcje ok 100 ml po każdym biegunkowym stolcu lub po wymiotach.

Przeciwwskazania Biflorin Elektrolity, proszek saszetki, 10 szt.

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w przypadku niedrożności jelit, wystąpienia krwi w stolcu lub wstrząsy hemodynamicznego. Nie należy stosować u osób, u których nie istnieje ryzyko odwodnienia.

Informacje dodatkowe Biflorin Elektrolity, proszek saszetki, 10 szt.

Produkt zawiera glukozę - chorzy na cukrzycę powinni być ostrożni. Produkt zawiera sód i potas - osoby leczone na nadciśnienie powinny zachować ostrożność.

Produkt musi być stosowany pod nadzorem lekarza. Nie jest odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia, ani nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej 25 . Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawiera cukier oraz substancję słodzącą.