

# Bobolen Baby, syrop na suchy kaszel od 6 miesiąca życia, 115 ml



Cena: 14,48 zł

## Opis słownikowy

Marka	Bobolen
Postać	syrop
Producent	Polski Lek
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Skład Bobolen Baby, syrop na suchy kaszel od 6 miesiąca życia, 115 ml

glicerol, ekstrakt z korzenia prawoślazu DER 3-4:1 (0,55% m/m). Pozostałe składniki: syrop maltitolowy, sok jabłkowy, woda oczyszczona, benzoesan sodu.

Wyrób nie zawiera cukru, aromatów i barwników.

Opakowanie zawiera: 115 ml syropu oraz pipetę do odmierzenia dawki wyrobu.

### Wskazania Bobolen Baby, syrop na suchy kaszel od 6 miesiąca życia, 115 ml

Wyrób medyczny należy stosować w celu redukcji suchego kaszlu. Jego receptura zawiera ekstrakt z prawoślazu oraz glicerol, które pomagają powlekać i osłaniać śluzówkę jamy ustnej i gardła.

### Dawkowanie Bobolen Baby, syrop na suchy kaszel od 6 miesiąca życia, 115 ml

Dorośli i młodzież od 12. roku życia: 10 ml syropu stosować 3-6 razy w ciągu doby.

Dzieci pomiędzy 6. a 12. rokiem życia: 5 ml syropu stosować 5 razy dziennie.

Dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia: 4 ml syropu stosować 4 razy w ciągu doby.

Dzieci pomiędzy 1. a 3. rokiem życia: 3 ml syropu stosować 4 razy w ciągu doby.

Dzieci powyżej 6. miesiąca życia: 1-2 ml syropu stosować 4 razy w ciągu doby.

Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z ulotką/instrukcją dołączoną do wyrobu.

## Informacje dodatkowe Bobolen Baby, syrop na suchy kaszel od 6 miesiąca życia, 115 ml

Syrop może być podawany dzieciom poniżej 1. roku życia tylko po konsultacji z lekarzem.

Wyrobu nie należy stosować w przypadku uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu, a także złego wchłaniania fruktozy lub wrodzonej nietolerancji fruktozy (fruktozemia).

Przyjęcie zbyt dużej ilości wyrobu może być przyczyną efektu przeczyszczającego.

Nie stosować z innymi preparatami podawanymi doustnie.

W przypadku braku poprawy lub nasilenia się objawów po 3 dniach stosowania wyrobu, należy skonsultować się z lekarzem.

Szczegółowe informacje nt. bezpieczeństwa stosowania znajdują się na ulotce/instrukcji dołączonej do wyrobu medycznego.