Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Bobotic Forte, krople doustne od 28 dnia życia, 30 ml

Cena: 41,19 zł

Opis słownikowy

Marka	Bobotic
Postać	krople
Producent	Polpharma
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Simetikon

Opis produktu

Skład Bobotic Forte, krople doustne od 28 dnia życia, 30 ml

Symetykon, sodu benzoesan, kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa, guma ksantanowa, aromat malinowy, woda oczyszczona.

Wyrób medyczny nie zawiera cukru i może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Działanie Bobotic Forte, krople doustne od 28 dnia życia, 30 ml

Wyrób medyczny Bobotic Forte:

obniża napięcie powierzchniowe ścian pęcherzyków gazu znajdujących się w jelitach, ułatwia ich łączenie i pękanie, usprawnia to wydalanie gazów i zmniejsza napięcie jelit, które jest przyczyną bólu,
zawiera symetykon, który po podaniu doustnym nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest całkowicie wydalany z kałem w postaci niezmienionej.

Wskazania Bobotic Forte, krople doustne od 28 dnia życia, 30 ml

Wyrób medyczny Bobotic Forte przeznaczony jest do stosowania u niemowląt od 28 dnia życia i dzieci do 12 lat w celu łagodzenia objawów, takich, jak kolka, wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie, niestrawność, związanych z nagromadzeniem gazu w obrębie przewodu

pokarmowego.

Pomocniczo w przygotowaniu niemowląt od 28 dnia życia i dzieci do 12 lat do badań diagnostycznych jamy brzusznej, takich jak badania radiologiczne i ultrasonograficzne oraz wziernikowanie żołądka i dwunastnicy.

Dawkowanie Bobotic Forte, krople doustne od 28 dnia życia, 30 ml

Bobotic Forte należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.Przed użyciem należy wstrząsnąć buteleczką do uzyskania jednolitego płynu. Butelka wyposażona jest w kroplomierz, za pomocą którego należy odliczyć zalecaną ilość kropli, które można podać do buzi dziecka przy pomocy dołączonej do opakowania łyżeczki lub nakroplić na smoczek przed podaniem go dziecku. Odmierzoną ilość płynu można wymieszać z niewielką ilością przegotowanej, ostudzonej wody, stosowanej odżywki (mleka) lub innego niegazowanego płynu.

Sposób użycia wyrobu w celu łagodzenia objawów takich jak: kolka, wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie, niestrawność oraz innych objawów związanych z nagromadzeniem gazu w obrębie przewodu pokarmowego:
Niemowlęta (od 28 dnia życia) i dzieci do 2 lat: 3 krople (20 mg symetykonu) przed, w trakcie lub po każdym posiłku. Nie należy przyjmować więcej niż 18 kropli na dobę (120 mg symetykonu).
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: 6 kropli (40 mg symetykonu) przed, w trakcie lub po każdym posiłku. Nie należy przyjmować więcej niż 36 kropli na dobę (240 mg symetykonu). Podawana ilość może być modyfikowana zgodnie ze wskazaniem lekarza.
W przypadku przygotowania do badań diagnostycznych:
W dniu poprzedzającym badania należy przyjąć:

Niemowlęta od 28 dnia życia i dzieci do 2 lat: 3 krople (20 mg symetykonu) 2 razy na dobę
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: 6 kropli (40 mg symetykonu) 2 razy na dobę
Rano w dniu badania, na czczo, należy przyjąć:

Niemowlęta od 28 dnia życia i dzieci do 2 lat : 3 krople (20 mg symetykonu)
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: 6 kropli (40 mg symetykonu)
Czas stosowania wyrobu medycznego Bobotic Forte jest zależny od utrzymywania się dolegliwości.

Wyrób medyczny bez konsultacji z lekarzem można stosować do 4 tygodni.

Przeciwwskazania Bobotic Forte, krople doustne od 28 dnia życia, 30 ml

Nie należy stosować po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Informacje dodatkowe Bobotic Forte, krople doustne od 28 dnia życia, 30 ml

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
Nie stosować w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego.
Nie stosować u noworodków (tzn. do 28 dnia życia)
W przypadku występowania u dziecka długotrwałych i niewyjaśnionych dolegliwości brzusznych zawsze należy skonsultować się z lekarzem.
W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Rozpoczęte opakowanie należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.