

Bronchicum N, 0,75 g / 5 ml syrop, 100 ml



Cena: 9,79 zł

Opis słownikowy

Postać	syrop
Producent	Sanofi Aventis
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Tymianek

Opis produktu

Informacje podstawowe Bronchicum N, 0,75 g / 5 ml syrop, 100 ml

Bronchicum N to produkt leczniczy o działaniu wykrztuśnym stosowanym w leczeniu kaszlu związanego z przeziębieniem.

Skład Bronchicum N, 0,75 g / 5 ml syrop, 100 ml

Substancj? czynn? jest: p?ynny wyci?g z ziela tymianku (*Thymi extractum fluidum*).

100 ml syropu zawiera 15 g p?ynnego wyci?gu z tymianku (1:2-2,5);

mieszanina ekstrahentów: roztwór wodny amoniaku 10% (m/m): glicerol 85% (m/m): etanol 90% (V/V): woda (1:20:70:109).

Substancje pomocnicze: olejek ró?any, koncentrat aromatu miodowego, koncentrat soku wi?niowego, syrop inwertowany 81/55, syrop glukozowy, syrop cukrowy, roztwór

67%, sodu benzoesan kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona.

Działanie Bronchicum N, 0,75 g / 5 ml syrop, 100 ml

Bronchicum N wykazuje działanie wykrztuśne, łagodzi objawy kaszlu.

Wskazania Bronchicum N, 0,75 g / 5 ml syrop, 100 ml

kaszel towarzyszący przeziębieniu.

Dawkowanie Bronchicum N, 0,75 g / 5 ml syrop, 100 ml

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Leku nie stosować bezpośrednio przed snem.

Stosować kolejne dawki w regularnych odstępach czasu.

Przed każdym użyciem wstrząsnąć.

Podczas stosowania leku należy przyjmować zwiększoną ilość płynów.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 10-20 ml (1-2 łyżki stołowe) 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku 4-12 lat: 5 ml (1 łyżeczka od herbaty) 3 do 5 razy na dobę.

Przeciwwskazania Bronchicum N, 0,75 g / 5 ml syrop, 100 ml

Kiedy nie stosować leku Bronchicum N:

w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
w przypadku osób z chorobą alkoholową (lek zawiera etanol),
u dzieci poniżej 4 lat.

Informacje dodatkowe Bronchicum N, 0,75 g / 5 ml syrop, 100 ml

Stosowanie leku należy omówić z lekarzem jeśli: występują lub występowały choroby wątroby, układu nerwowego, cukrzyca, epilepsja.

Lek zawiera alkohol - nie stosować u osób z chorobą alkoholową i u dzieci poniżej 4 lat.

Lek jest pochodzenia roślinnego - smak i barwa mogą ulegać nieznacznym zmianom.

Lek Bronchicum N zawiera syrop cukrowy, syrop glukozowy, syrop inwertowany 81/55.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Po otwarciu opakowania lek zachowuje trwałość przez 6 miesięcy.