Bronchosol, (218 mg+0,989 mg)/5 ml syrop, 200 ml



Cena: 15,84 zł

Opis słownikowy

Marka	Bronchosol
Postać	syrop
Producent	Phytopharm
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Tymianek

Opis produktu

Informacje podstawowe Bronchosol, (218 mg+0,989 mg)/5 ml syrop, 200 ml

Bronchosol jest syropem stosowanym tradycyjnie jako środek wykrztuśny i pobudzający wydzielanie płynnego śluzu w oskrzelach.

Skład Bronchosol, (218 mg+0,989 mg)/5 ml syrop, 200 ml

Substancją czynną jest gęsty wyciąg złożony (3:1) z ziela tymianku (Thymus vulgaris) i korzenia pierwiosnka (Primula veris) oraz tymol (Thymolum).

100 ml syropu zawiera:

- 4360 mg wyciągu gęstego złożonego (3:1)
- 19,8 mg tymolu

Substancje pomocnicze: aromat pomarańczowy, sacharoza, woda oczyszczona.

Lek zawiera nie więcej niż 0,5%(m/m) etanolu.

Działanie Bronchosol, (218 mg+0,989 mg)/5 ml syrop, 200 ml

Dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, korzeni pierwiosnka oraz tymolu, syrop działa wyktrzuśnie i pobudza wydzielanie śluzu w oskrzelach.

Bronchosol jest tradycyjnym lekiem roślinnym i jego skuteczność działania opiera się wyłącznie na doświadczeniu płynącym z długiego okresu stosowania leku.

Wskazania Bronchosol, (218 mg+0,989 mg)/5 ml syrop, 200 ml

Bronchosol jest stosowany tradycyjnie w kaszlu i utrudnionym odkrztuszaniu w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych.

Dawkowanie Bronchosol, (218 mg+0,989 mg)/5 ml syrop, 200 ml

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowane dawki:

Dzieci 4-6 lat - 3 razy po 2,5 ml
Dzieci 6-12 lat - 3 razy po 5 ml
Młodzież 12-18 lat - 3 razy po 10 ml
Dorośli - 3 razy po 15 ml

- Podawać syrop odmierzony załączoną miarką.
- Ostatnią dawkę leku podawać nie później niż 3 godziny przed udaniem się na spoczynek.
- Przed użyciem wstrząsnąć.
- Lek stosować samodzielnie do 7 dni, jeśli do tego czasu nie miną objawy. należy zgłosić się do lekarza.

Przeciwwskazania Bronchosol, (218 mg+0,989 mg)/5 ml syrop, 200 ml

Kiedy nie stosować leku Bronchosol:

- w nadwrażliwości na tymol, pierwiosnek, tymianek lub którykolwiek składnik syropu,
- w nadwrażliwości na rośliny z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) zwanych też wargowymi (Labiatae),
- u dzieci, u których w wywiadzie stwierdza się ostre krupowe zapalenie krtani, również w przeszłości,
- w astmie.

Informacje dodatkowe Bronchosol, (218 mg+0,989 mg)/5 ml syrop, 200 ml

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Bronchosol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych po stosowaniu syropu Bronchosol.
Mogą jednak wystąpić takie działania niepożądane jak:

- zaburzenia gastryczne,
- nudności,
- wymioty,
- reakcje alergiczne.

Częstość występowania nie jest znana.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Zachować szczególną ostrożność stosując lek u osób z objawami podrażnienia żołądka (nudności) i w zapaleniu oraz wrzodach żołądka.
- Syrop (5 ml) zawiera ok. 4,2 g cukru, co odpowiada 0,35 jednostki chlebowej.
- Produkt leczniczy przechowywać w temperaturze do 25°C.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku podczas ciąży i laktacji, dlatego nie zaleca się stosowania u kobiet w tym okresie. Przed użyciem preparatu należy zasięgnąć opinii lekarza.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 4 roku życia.