

Butiner 500, tabletki, 30 szt.

Cena: 37,59 zł



Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	Nerr Pharma
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Maślan sodu

Opis produktu

Informacje podstawowe Butiner 500, tabletki, 30 szt.

Butiner 500 to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierająca kwas masłowy w postaci maślanu sodu. Preparat przeznaczony jest do postępowania dietetycznego w zaburzeniach czynnościowych jelit takich jak zespół jelita drażliwego, chorobach zapalnych jelit, w tym wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz chorobie Crohna, zakażeniach układu pokarmowego, bieguncie występującej na skutek antybiotykoterapii, bieguncie podróźnych, zaburzeniach flory jelitowej oraz niedoborach kwasu masłowego, pojawiających się na skutek stosowania diety ubogoresztkowej zawierającej niewielkie ilości błonnika pokarmowego.

Specjalna otoczka tabletki chroni składnik aktywny preparatu przed działaniem soku żołądkowego oraz zabezpiecza przed wchłonięciem w jelicie cienkim. Tabletki dojelitowe o kontrolowanym uwalnianiu pozwalają na dotarcie do jelita grubego.

Skład Butiner 500, tabletki, 30 szt.

Maślan sodu, substancja wiążąca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: fosforan wapnia, otoczka (substancja glazurująca: anionowy kopolimer metakrylanu, substancje przeciwzbrylające: polisorbit 80, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, substancja wiążąca: cytrynian trietylowy), substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

100 g produktu zawiera:

wartość energetyczna 836 kJ/ 199 kcal,
tłuszcz 2,8 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,8 g; węglowodany 0 g, w tym cukry 0 g; białko 0 g; sól 29,8 g,
maślan sodu 56,1 g.

1 tabletki zawiera:

wartość energetyczna 7,6 kJ/ 1,8 kcal,
tłuszcz 0,03 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,03 g; węglowodany 0 g, w tym cukry 0 g; białko 0 g; sól 0,26 g,
maślan sodu 0,5 g.

Wskazania Butiner 500, tabletki, 30 szt.

Preparat butiner 500 zawierający wysoką dawkę kwasu masłowego jest szczególnie polecany w:

zaburzeniach czynnościowych jelit (zespół jelita drażliwego)

chorobach zapalnych jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna)

zakażeniach przewodu pokarmowego

biegunce poantybiotykowej

biegunce podróży

zaburzeniach flory jelitowej

niedoborach kwasu masłowego np. przy stosowaniu diety ubogoresztkowej zawierającej małe ilości błonnika pokarmowego.

Dawkowanie Butiner 500, tabletki, 30 szt.

Tabletki należy połknąć w całości, popijając wodą (nie rozgryzać).

Zaleca się stosowanie preparatu przez okres co najmniej 6 tygodni.

Lekarz może zalecić inny sposób stosowania preparatu w zależności od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta.

Przeciwwskazania Butiner 500, tabletki, 30 szt.

Nie powinien być stosowany przez osoby niemające określonej choroby, zaburzeń lub schorzeń, których dotyczy zamierzone stosowanie.

Nie stosować przy uczuleniu na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie stosować u osób z zaburzeniami połykania lub gdy połykanie tabletek sprawia trudność.

Informacje dodatkowe Butiner 500, tabletki, 30 szt.

Preparat może posiadać zapach charakterystyczny dla maślanu sodu (otoczka tabletki pozwala ograniczyć odczuwanie zapachu, lecz nie likwiduje go całkowicie).