

Camilia, roztwór doustny, 10 minimsów (import równoległy, Pharmapoint)



Cena: 30,19 zł

Opis słownikowy

Marka	Camilia
Postać	roztwór
Producent	Pharmapoint
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Homeopatyczny produkt leczniczy

Opis produktu

Informacje podstawowe Camilia, roztwór doustny, 10 minimsów (import równoległy, Pharmapoint)

Camilia jest homeopatycznym produktem leczniczym ze wskazaniami leczniczymi stosowanym w bolesnym ząbkowaniu u niemowląt.

Import: Pharmapoint

Skład Camilia, roztwór doustny, 10 minimsów (import równoległy, Pharmapoint)

Substancjami czynnymi leku s?:

- Chamomilla vulgaris 9 CH,
- Phytolacca decandra 5 CH,
- Rheum 5 CH.

1 ml leku (1 pojemniczek) zawiera 333,3 mg ka?dej substancji czynnej.

Substancja pomocnicza: woda oczyszczona.

Działanie Camilia, roztwór doustny, 10 minimsów (import równoległy, Pharmapoint)

Lek homeopatyczny Camilia łagodzi objawy bólowe towarzyszące ząbkowaniu.

Wskazania Camilia, roztwór doustny, 10 minimsów (import równoległy, Pharmapoint)

Camilla jest lekiem homeopatycznym stosowanym w bolesnym ząbkowaniu u niemowląt.

Dawkowanie Camilia, roztwór doustny, 10 minimsów (import równoległy, Pharmapoint)

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Sposób użycia:

3-6 razy na dobę wkraplać doustnie zawartość całego pojemniczka (minimsa).

Nie stosować więcej niż 6 pojemniczków (minimsów) na dobę.

Leczenie kontynuować przez 3 do 8 dni.

Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, wskazane jest zasięgnięcie porady lekarza w celu potwierdzenia, że są one związane z ząbkowaniem.

Można powtórzyć powyższy schemat dawkowania przy kolejnym wystąpieniu objawów ząbkowania.

Przeciwwskazania Camilia, roztwór doustny, 10 minimsów (import równoległy, Pharmapoint)

Leku homeopatycznego Camilia nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne.

Informacje dodatkowe Camilia, roztwór doustny, 10 minimsów (import równoległy, Pharmapoint)

Działania niepożądane

Nie są znane działania niepożądane.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie wkraplać do oczu i uszu.

Nie wstrzykiwać.

W przypadku wystąpienia objawów mogących towarzyszyć ząbkowaniu, takich jak m.in.: wystąpienie gorączki, biegunki lub znacznego nasilenia objawów bólowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Minimsy są przeznaczone do jednorazowego użycia. Nie należy ich przechowywać po otwarciu.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje z innymi lekami.