

Carbo Medicinalis MF, 250 mg tabletki, 20 szt.

Cena: 11,58 zł



Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	Medicofarma
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Węgiel

Opis produktu

Informacje podstawowe Carbo Medicinalis MF, 250 mg tabletki, 20 szt.

Carbo medicinalis MF to produkt leczniczy do stosowania w biegunce i wzdęciach.

Skład Carbo Medicinalis MF, 250 mg tabletki, 20 szt.

Substancją czynną jest: węgiel aktywny (węgiel leczniczy) (Carbo activatus).

1 tabletkę zawiera 250 mg węgla aktywnego.

Substancje pomocnicze: sacharoza, laktoza, karmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Działanie Carbo Medicinalis MF, 250 mg tabletki, 20 szt.

Węgiel aktywny (węgiel leczniczy) posiada właściwości adsorbujące - wiąże na swojej powierzchni znajdujące się w przewodzie pokarmowym substancje, w tym nasilające perystaltykę i powodujące biegunkę (toksyny bakteryjne, bakterie, gazy jelitowe, produkty gnilne). Wykazuje działanie zapierające.

Wskazania Carbo Medicinalis MF, 250 mg tabletki, 20 szt.

biegunka,
wzdęcia,
w porozumieniu z lekarzem - zatrucia lekami lub innymi substancjami chemicznymi.

Dawkowanie Carbo Medicinalis MF, 250 mg tabletki, 20 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

wzdęcia: 4-5 tabletek kilka razy na dobę aż do ustąpienia objawów,
biegunka: 12-16 tabletek jednorazowo. Tabletki przed połknięciem należy rozkruszyć lub podgryźć. Najlepiej podawać w postaci wodnej papki przygotowanej z rozkruszonych tabletek.
zatrucia lekami lub innymi substancjami toksycznymi: jednorazowo podać 49-50 tabletek.

Przeciwwskazania Carbo Medicinalis MF, 250 mg tabletki, 20 szt.

Kiedy nie stosować leku Carbo medicinalis MF:

w przypadku uczulenia na węgiel leczniczy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
u osób nieprzytomnych.

Informacje dodatkowe Carbo Medicinalis MF, 250 mg tabletki, 20 szt.

Lek należy stosować ostrożnie w przypadku zatrucia środkami wpływającymi na perystaltykę.
Środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i tylko sporadycznie podczas leczenia węglem aktywnym.
Lek zawiera sacharozę - przyjęcie więcej niż 27 tabletek przekracza 5g/24h sacharozy.

Lek zawiera laktozę.

Pacjenci przyjmujący preparat przez 7 dni z powodu wzdęć lub 2 dni z powodu biegunki, u których pomimo leczenia utrzymują się objawy powinni skontaktować się z lekarzem.

Jeśli podczas leczenia biegunki wystąpi krew w stolcu lub gorączka, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.