

# Chlorchinaldin, 2 mg tabletki do ssania o smaku czarnej porzeczki, 20 szt.

Cena: 10,17 zł



## ZASTOSUJ NA INFEKCJĘ GARDŁA

Lek antyseptyczny na infekcje jamy ustnej i gardła\*

20 TABLETEK DO SSANIA

\*m.in. na następujące drobnoustroje: *Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Prostus wolgerii*, *Escherichia coli*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Pseudomonas pyogenes*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, *Candida albicans*  
- ChPL Chlorchinaldin VR 2 mg tabletki

Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki, 2 mg. Skład: 1 tabletki do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu (Chlorochinaldolum). Postać farmaceutyczna: tabletki do ssania. Wskazania: do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł, w przeziawkach, w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu ampicylinami. Podmiot odpowiedzialny: Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24PPT3, Irlandia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

## Opis słownikowy

Marka	Chlorchinaldin
Postać	tabletki do ssania
Producent	Pharmaswiss
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Chlorochinaldol

## Opis produktu

## Informacje podstawowe Chlorchinaldin, 2 mg tabletki do ssania o smaku czarnej porzeczki, 20 szt.

Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki to leki stosowany w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł lub pleśniawkach. Lek działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo jak również przeciwpierwotniakowo.

Smak czarnej porzeczki.

## Skład Chlorchinaldin, 2 mg tabletki do ssania o smaku czarnej porzeczki, 20 szt.

Substancj? czynn? leku jest chlorochinaldol (*Chlorochinaldolum*).

1 tabletki do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu.

Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, sacharoza, karmeloza sodowa, talk, aromat czarnej porzeczki, magnezu stearynian.

## Działanie Chlorchinaldin, 2 mg tabletki do ssania o smaku czarnej porzeczki, 20 szt.

Lek Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwpiętwniakowo.

## Wskazania Chlorchinaldin, 2 mg tabletki do ssania o smaku czarnej porzeczki, 20 szt.

Lek Chlorchinaldin wskazany jest do stosowania miejscowego w:

zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł,  
pleśniawkach,  
zakażeniach grzybiczych jamy ustnej oraz gardła po leczeniu antybiotykami.

## Dawkowanie Chlorchinaldin, 2 mg tabletki do ssania o smaku czarnej porzeczki, 20 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się w jamie ustnej - tabletki należy powoli ssać, nie rozgryzać.

Nie stosować leku podczas posiłków.

Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie: Co 1 - 2 godziny ssać 1 tabletkę.

Nie należy stosować dawki większej niż 10 tabletek do ssania na dobę.

## Przeciwwskazania Chlorchinaldin, 2 mg tabletki do ssania o smaku czarnej porzeczki, 20 szt.

Kiedy nie stosować leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki:

jeśli pacjent ma uczulenie na chlorochinaldol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

## Informacje dodatkowe Chlorchinaldin, 2 mg tabletki do ssania o smaku czarnej porzeczki, 20 szt.

Jeśli dolegliwości utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku przez kilka dni, należy zgłosić się do lekarza, który zaleci odpowiednie leczenie. W zakażeniach bakteryjnych często konieczne jest zastosowanie odpowiedniego antybiotyku o działaniu ogólnoustrojowym, a Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki stosuje się jedynie pomocniczo.

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może wpływać szkodliwie na zęby.

Przechowywanie:

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Chronić od światła i wilgoci.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

