

Chlorivag Kadefarm, globulki dopochwowe, 10 szt

Cena: 35,89 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Postać | globulki |
| Producent | Kadefarm |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |
| Substancja czynna | Bromelina, Chlorheksydyna, Witamina E |

Opis produktu

Informacje podstawowe Chlorivag Kadefarm, globulki dopochwowe, 10 szt

Chlorivag® działa zapobiegawczo i leczniczo w chorobach pochwy o charakterze zapalnym, infekcyjnym lub dystroficznym. Rekomendowany w przypadku zaczerwienienia, świądu, pieczenia z oznakami mikozy i waginozy. Kwas hialuronowy, posiadający właściwości wiązania do błony śluzowej, wykazuje działanie nawilżające i ochronne na śluzówkę pochwy.

Skład Chlorivag Kadefarm, globulki dopochwowe, 10 szt

Jedna globulka 2 g zawiera: sól sodowa kwasu hialuronowego, witamina E, bromelaina, dichlorowodorek chlorheksydyny (konserwant), półsyntetyczne glicerydy.

Działanie Chlorivag Kadefarm, globulki dopochwowe, 10 szt

Chlorivag działa zapobiegawczo i leczniczo w chorobach pochwy o charakterze zapalnym, infekcyjnym lub dystroficznym. Rekomendowany w przypadku zaczerwienienia, świądu, pieczenia z oznakami mikozy i waginozy. Kwas hialuronowy, posiadający właściwości wiązania do błony śluzowej, wykazuje działanie nawilżające i ochronne na śluzówkę pochwy.

Wspomaga produkcję śluzu i utrzymuje prawidłowe nawilżenie błon śluzowych.
Przyspiesza gojenie i regenerację mikrourazów nabłonka pochwy.
Zapobiega nawracającym infekcjom bakteryjnym błon śluzowych.

Utrzymuje prawidłowe środowisko pochwy.

Wskazania Chlorivag Kadefarm, globulki dopochwowe, 10 szt

uzupełnienie terapii przeciwzapalnej pochwy sromu,
profilaktyka przeciw nawrotom chorób śluzówki pochwy o charakterze zapalnym, dystroficznym i infekcyjnym,
terapia wspomagająca w odbudowie prawidłowego nawilżenia śluzówki pochwy, silne działanie łagodzące w przypadku świądu,
zaczerwienienia, podrażnienia spowodowanych różnymi typami chorób w okolicy pochwy i sromu, terapia wspomagająca przed i po
ginekologicznych zabiegach chirurgicznych.

Dawkowanie Chlorivag Kadefarm, globulki dopochwowe, 10 szt

Przed zastosowaniem globulki zawsze umyj ręce ciepłą wodą z mydłem
Wyjmij globulkę z folii poprzez jej wyciśnięcie.
Trzymając globulkę kciukiem i palcem wskazującym, połóż się na plecach, unosząc kolana i rozchulając nogi. W tej pozycji delikatnie
umieść globulkę palcem wskazującym w pochwie tak głęboko, jak to możliwe.
Chlorivag globulki powinny być stosowane przed snem. 1 globulka dziennie przez 10 dni.

Informacje dodatkowe Chlorivag Kadefarm, globulki dopochwowe, 10 szt

Produkt wyłącznie do stosowania dopochwowego.
Nie połykać.
Nie używać w przypadku nadwrażliwości lub nietolerancji któregośkolwiek ze składników produktu.
W przypadku ciąży bądź karmienia piersią globulki powinny być używane wyłącznie po zaleceniu lekarza lub farmaceuty.
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.