

Contril, 60 mg/10 ml syrop smak wiśniowy, 120 ml



Cena: 15,88 zł

Opis słownikowy

Postać	syrop
Producent	Us Pharmacia
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Lewodropropizyna

Opis produktu

Informacje podstawowe Contril, 60 mg/10 ml syrop smak wiśniowy, 120 ml

Syrop Contril® to lek przeciwkaszlowy o wiśniowym smaku przeznaczony dla dzieci po 2 roku życia oraz dorosłych. Preparat stosuje się doustnie w leczeniu suchego (nieproduktywnego) kaszlu towarzyszącego np. zakażeniu górnych lub dolnych dróg oddechowych, krztuścowi.

Skład Contril, 60 mg/10 ml syrop smak wiśniowy, 120 ml

10 ml syropu zawiera:

substancję czynną: lewodropropizynę (Levodropropizinum) 60 mg,
substancje pomocnicze: sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), kwas cytrynowy jednowodny, aromat wiśniowy 0527477 (zawiera m.in. glikol propylenowy), sodu wodorotlenek, roztwór 10%, kwas cytrynowy jednowodny, roztwór 10%, woda oczyszczona.

Działanie Contril, 60 mg/10 ml syrop smak wiśniowy, 120 ml

Substancją czynną preparatu leczniczego Contril® jest lewodropropizyna o działaniu przeciwkaszlowym, która wpływając na receptory kaszlu w oskrzelach i tchawicy, znosi skurcz oskrzeli. Mechanizm jej działania polega na hamującym wpływie na włókna C. Lewodropropizyna zmniejsza częstotliwość i natężenie kaszlu, hamuje odruch kaszlu, a także ułatwia oddychanie, przynosząc ulgę w suchym uporczywym kaszlu.

Wskazania Contril, 60 mg/10 ml syrop smak wiśniowy, 120 ml

Lek Contril stosuje się u dorosłych i dzieci po 2 roku życia:

w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu o różnym pochodzeniu np.
kaszel związany z zakażeniami górnych i dolnych dróg oddechowych,
kaszel w przebiegu raka płuc,
krzusiec.

Dawkowanie Contril, 60 mg/10 ml syrop smak wiśniowy, 120 ml

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku powyżej 2 lat o masie ciała 10-20 kg: 3 ml maksymalnie 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 2 lat o masie ciała 21-30 kg: 5 ml maksymalnie 3 razy na dobę.

Dorośli: 10 ml maksymalnie 3 razy na dobę.

Leku Contril® nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem. Produkt leczniczy należy stosować doustnie 3 razy na dobę w odstępach co najmniej 6 godzin. Leczenie należy kontynuować do ustąpienia kaszlu lub zgodnie z zaleceniami lekarza. W każdym przypadku, gdy kaszel nie ustępuje po 7 dniach leczenia, zaleca się przerwanie stosowania leku i zasięgnięcie porady lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania Contril, 60 mg/10 ml syrop smak wiśniowy, 120 ml

Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku.

Obfita wydzielona oskrzelowa i zaburzenia czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek).

Czas ciąży i karmienia piersią.

Wiek poniżej 2 lat.

Informacje dodatkowe Contril, 60 mg/10 ml syrop smak wiśniowy, 120 ml

Przed zastosowaniem leku Contril® należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek jest stosowany w leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu i można go stosować tylko w oczekiwaniu na rozpoznanie przyczyny kaszlu i (lub) efekt leczenia choroby powodującej ten kaszel.

Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjęciu większej niż zalecana dawka leku.

Należy przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarza, gdy kaszel nie ustępuje po 7 dniach leczenia.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku Contril® dłużej niż 7 dni.

Lek Contril® zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan. Preparat może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek Contril® zawiera 4 g sacharozy w 10 ml syropu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku, jeżeli stwierdzono wcześniej u niego nietolerancję niektórych cukrów.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie wyrzucać leku do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku nie stosuje się u dzieci poniżej 2 lat.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania lewodropropizyny (składnika leku Contril®) u osób w podeszłym wieku. Istnieją dowody zmiany wrażliwości na wiele leków w tej grupie pacjentów.

Stosowanie u osób z zaburzeniami czynności nerek

Zaleca się ostrożność podczas stosowania leku Contril® u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Contril® jest przeciwwskazany dla kobiet w ciąży, planujących ciążę, a także w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem tego leku pacjentka w ciąży, karmiąca piersią lub przypuszczająca, że może być w ciąży lub planująca mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn

Należy zachować ostrożność u pacjentów, którzy zamierzają prowadzić pojazdy lub obsługiwać urządzenia mechaniczne. Lek Contril® w rzadkich przypadkach może powodować senność.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Galeria



DAWKOWANIE


WISNIOWY SMIAK

Dla dzieci w wieku powyżej 2 lat oraz dorosłych:

	3 mL x max. 3 /na dobę
Dzieci (10-20 kg)	
	5 mL x max. 3 /na dobę
Dzieci (21-30 kg)	
	10 mL x max. 3 /na dobę
Dorośli	

DLACZEGO Contril ?

- Zawiera substancję czynną lewodropropizynę, która hamuje odruch kaszlu w drogach oddechowych
- Posiada korzystny profil bezpieczeństwa* (działania niepożądane występują bardzo rzadko)
- Może być stosowany już powyżej 2 roku życia



*Odniesienie: lewodropropizyna. Na podstawie DPH, Contril. Badania kliniczne w kierunku skuteczności i tolerancji na rynku - w poraż 30 krajach na całym świecie - praktycznie zero niepożądanych działań. Wzrost skuteczności i tolerancji leku.