

## Cyclo 3 Fort, kapsułki twarde, 30 szt.



Cena: 33,99 zł

### Opis słownikowy

Postać	kapsułki
Producent	Pierre Fabre
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Hesperydyna, Ruszczyk, Witamina C

### Opis produktu

#### Informacje podstawowe Cyclo 3 Fort, kapsułki twarde, 30 szt.

Cyclo 3 Fort to produkt leczniczy, który wpływa na elastyczność naczyń żylnych, o działaniu ochraniającym naczynia krwionośne, do stosowania w niewydolności żylniej (uczucie ciężkich nóg) i pomocniczo w hemoroidach.

#### Skład Cyclo 3 Fort, kapsułki twarde, 30 szt.

**Substancjami czynnymi s?:** suchy wyci?g z ruszczyka kolczastego (*Ruscus aculeatus* L., *rhizoma*), hesperydyna, kwas askorbowy (witamina C).

1 kapsu?ka twarda zawiera 150 mg suchego wyci?gu z k??cza ruszczyka kolczastego (5 – 7,5 :1), ekstrahent: etanol 85% (v/v); 150 mg hesperydyny metylochalkonu; 100 mg kwasu askorbowego (witaminy C).

**Substancje pomocnicze:** krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, stearynian

magnezu, talk, glikol polioksyetylenowy (Macrogol) 6000; *otoczka kapsu?ki*: denko (koloru ?ó?tego) - ?ó?cie? chinolinowa (E 104), ?ó?cie? pomara?czowa FCF (E 110), tytanu dwutlenek (E 171), ?elatyna; wieczko (koloru pomara?czowego) - ?ó?cie? pomara?czowa FCF (E 110), tytanu dwutlenek (E 171), ?elatyna.

### Działanie Cyclo 3 Fort, kapsułki twarde, 30 szt.

Cyclo 3 Fort zawiera 3 substancje czynne, które wpływają na elastyczność naczyń żylnych. Lek ten działa tonizująco i ochraniająco na naczynia krwionośne (następuje poprawa napięcia ścian naczyń żylnych, odporność naczyń włosowatych, obniża przepuszczalność naczyń krwionośnych).

### Wskazania Cyclo 3 Fort, kapsułki twarde, 30 szt.

leczenie objawowe niewydolności naczyń żylnych (uczucie ciężkości w kończynach dolnych, ból),  
leczenie pomocnicze w dolegliwościach żylaków odbytu.

### Dawkowanie Cyclo 3 Fort, kapsułki twarde, 30 szt.

<html>  
  
<p style="box-sizing: border-box; color: #21253d; font-family: Lato, sans-serif; line-height: 1.4; font-size: 14px;">Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.</p>  
  
<ul style="box-sizing: border-box; color: #21253d; font-family: Lato, sans-serif; font-size: 14px;">  
<li style="box-sizing: border-box;">Lek do stosowania doustnego.</li>  
<li style="box-sizing: border-box;">Kapsułki należy stosować ze szklanką wody.</li>  
<li style="box-sizing: border-box;">Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.<br /><br /></li>  
</ul>  
  
<p style="box-sizing: border-box; color: #21253d; font-family: Lato, sans-serif; line-height: 1.4; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">Leczenie objawowe niewydolności naczyń żylnych:</span> 2-3 kapsułki dziennie w schemacie 1 kapsułka rano i 1 kapsułka wieczorem lub 2 kapsułki rano i 1 kapsułka wieczorem.</p>  
  
<p style="box-sizing: border-box; color: #21253d; font-family: Lato, sans-serif; line-height: 1.4; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">Leczenie pomocnicze w żylakach odbytu:</span> 4-5 kapsułek dziennie w schemacie 2 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem lub 3 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem.</p>  
</html>

### Przeciwwskazania Cyclo 3 Fort, kapsułki twarde, 30 szt.

Kiedy nie stosować leku Cyclo 3 Fort:

w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne - wyciąg z ruszczyka, hesperydyny metylochalkon, kwas askorbowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

jeśli pacjent ma zaburzenia gospodarki żelazowej (w leku obecny jest kwas askorbowy).

## Informacje dodatkowe Cyclo 3 Fort, kapsułki twarde, 30 szt.

Jeśli podczas stosowania pojawi się stan zapalny skóry, owrzodzenia skórne - należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpi obrzęk 1 lub obu kończyn dolnych, niewydolność serca / nerek należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpi biegunka, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

W przypadku stosowania leku w zaburzeniach krążenia żylnego - jeśli po 2 tygodniach pojawił się dyskomfort lub kruchość naczyń, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek zawiera żółcień pomarańczową FCF (E 110), która może powodować reakcje alergiczne.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

### Ciąża i karmienie piersią

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Lek nie powinien być przyjmowany podczas karmienia piersią.

### Wpływ na badania laboratoryjne

Witamina C, czyli kwas askorbowy zawarty w leku może wpływać na niektóre wyniki badań laboratoryjnych jak: oznaczanie glukozy, bilirubiny, aktywności transaminazy, mleczanów etc.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Cyclo 3 Fort przeznaczony jest dla osób dorosłych.