

Debutir, czopki doodbytnicze, 10 szt. DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Cena: 18,89 zł



Opis słownikowy

Marka	Debutir
Postać	czopki
Producent	Polpharma
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Maślan sodu

Opis produktu

Informacje podstawowe Debutir, czopki doodbytnicze, 10 szt. DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Wyrób medyczny przeznaczony dla dorosłych w postaci czopków doodbytniczych o właściwościach wspomagających i łagodzących. Produkt pomaga odtworzyć naturalny stan fizjologiczny śluzówki odbytnicy. Wspiera również regenerację tkanek kanału odbytu po zabiegach chirurgicznych bądź radioterapii.

Skład Debutir, czopki doodbytnicze, 10 szt. DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Maślan sodu, alginian sodu, karboksymetyloceluloza, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych z dodatkiem mono- i diglicerydów.

Zawartość opakowania

2 blistry po 5 czopków, ulotka.

Działanie Debutir, czopki doodbytnicze, 10 szt. DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Stosowanie wyrobu medycznego pozwala wytworzyć na powierzchni śluzówki odbytnicy specjalną powłokę, która ma bardzo dobre właściwości przylegające i wysoką barierowość. Dzięki temu pomaga chronić i nawilżać odbytnicę i wytworzyć środowisko sprzyjające

odtworzeniu naturalnego stanu jej śluzówki. Produkt działa na tkanki odbytnicy fizycznie, zapewniając mechaniczną ochronę. Czopek szybko pęcznieje, jednocześnie zachowuje swoją strukturę po zwilżeniu. Przez to wytwarza w odbytnicy wilgotną powłokę o znacznej lepkości, plastyczności i dobrej barierowości.

Wskazania Debutir, czopki doodbytnicze, 10 szt. DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Debutir czopki doodbytnicze przeznaczone są do stosowania w celu:

odtworzenia naturalnego stanu fizjologicznego śluzówki odbytnicy,
wspomagania regeneracji nadżerek, pęknięć lub innych ubytków w obrębie błony śluzowej odbytnicy,
łagodzenia objawów bolesnego wypróżniania, które wynika z uszkodzenia nabłonka lub istnienia procesu zapalnego w odbytnicy,
wspierania regeneracji tkanek kanału odbytu po zabiegach chirurgicznych lub radioterapii.

Dawkowanie Debutir, czopki doodbytnicze, 10 szt. DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Przed aplikacją należy dokładnie umyć i osuszyć ręce.

Czopek należy ostrożnie umieścić w kanale odbytu. Najwygodniej tego dokonać leżąc na boku, z lekko podkurczonymi nogami.

Czopek należy wyjmować z blistra bezpośrednio przed zastosowaniem.

Poleca się aplikowanie czopka na noc.

Po użyciu należy umyć ręce.

Stosowanie produktu

Zalecana dawka to jeden czopek na dobę.

Czopki można stosować przez 5 dni. Stosowanie wyrobu może być kontynuowane do 10 dni w porozumieniu z lekarzem.

Przeciwwskazania Debutir, czopki doodbytnicze, 10 szt. DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Do głównych przeciwwskazań należą:

nadwrażliwość na którąkolwiek substancję wchodzącą w skład wyrobu,
zmiany nowotworowe w odbytnicy,
silny, ostry ból w okolicy odbytu,
krwawienie z odbytnicy (samoistne lub przy wypróżnianiu) rozumiane jako występowanie jasnoczerwonej krwi w stolcu.

W przypadku trzech ostatnich przeciwwskazań stosowanie wyrobu może być tylko i wyłącznie stosowane na wyraźne zlecenie lekarskie.

Informacje dodatkowe Debutir, czopki doodbytnicze, 10 szt. DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami

Nie stosować jednocześnie w trakcie używania innych doodbytnicznych wyrobów i leków bez porozumienia i konsultacji z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety w ciąży i karmiące piersią, przed zastosowaniem wyrobu powinny skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie preparatu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów o obsługiwanie maszyn.