

## Debutir Forte, kapsułki twarde, 60 szt.



Cena: 46,89 pln

### Opis słownikowy

Postać	kapsułki
Producent	Polpharma
Substancja czynna	-0

### Opis produktu

#### Informacje podstawowe

Debutir, kapsułki, 60 szt.

- Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla dorosłych i dzieci powyżej 7 roku życia.
- Środek spożywczy Debutir w kapsułkach zawiera sól sodową kwasu masłowego (maślan sodu) w postaci mikrogranulatu. Kwas masłowy jest ważnym źródłem energii dla nabłonka jelit i pozwala na prawidłowe funkcjonowanie jelit. Mikrogranulacja zapewnia lepszą dystrybucję maślanu sodu w przewodzie pokarmowym, pozwala na uwolnienie kwasu masłowego dopiero w jelicie cienkim i grubym. Skład mikrogranulki jest tak dobrany, aby proces uwalniania maślanu sodu odbywał się na całej długości jelita cienkiego i grubego.

#### Skład

Maślan sodu, całkowicie uwodorniony olej palmowy, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, substancja zagęszczająca: alginian sodu, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu.

Wartość odżywcza	100 g	w 1 kapsułce
Wartość energetyczna	1782 kJ 434 kcal	14,08 kcal 3,42 kJ
Tłuszcz, w tym	36 g	0,28 g
kwasy tłuszczowe nasycone	35 g	0,28 g
Węglowodany, w tym	13 g	0,10 g
cukry	0,2 g	0 g
Białko	0,3 g	0 g
Sól	17,9 g	0,14 g
Maślan sodu, w tym	37,97 g	300 mg
kwas masłowy	30,38 g	240 mg

#### Wskazania

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Debutir przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej 7. roku życia do postępowania dietetycznego w następujących schorzeniach:

- Chorobach jelita grubego przebiegających ze zmianami zanikowymi w obrębie błony śluzowej
- Zespole jelita nadwrażliwego (IBS)
- Zaburzeniach wchłaniania, prowadzących do niedoboru składników odżywczych, utraty masy ciała lub nieprawidłowego wzrastania u dzieci
- Zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego o charakterze czynnościowym takich, jak: przewlekłe zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia brzucha, dyspepsja, biegunki,
- Niedoborach pokarmowych (niedostateczna podaż błonnika pokarmowego, dieta ubogoresztkowa)
- Zaburzeniach flory jelitowej, m.in. po długotrwałej antybiotykoterapii, w przebiegu niektórych chorób przewlekłych (choroby trzustki, wątroby, nerek).

#### Dawkowanie

Środek spożywczy Debutir należy przyjmować pod nadzorem lekarza.

- Dorośli: doustnie 1 kapsułka dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 3 miesięcy.
- Dzieci powyżej 7. roku życia: doustnie 1 kapsułka dziennie, najlepiej wieczorem. Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 6 tygodni.

Kapsułkę należy połknąć w całości (bez rozgryzania i wysypywania zawartości), popijając letnią lub chłodną wodą. Najlepiej przyjmować w trakcie posiłku.

#### Przeciwwskazania

- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Produkt nie jest żywnością kompletną pod względem odżywczym. Nie nadaje się do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.
- Nie stosować przy braku wskazań lekarskich do spożywania produktu.
- Nie stosować u dzieci z zaburzeniami połykania lub w przypadkach, gdy połykanie kapsułek sprawia trudność.
- Przy uczuleniu (nadwrażliwości) na którykolwiek składnik produktu Debutir należy zaprzestać jego stosowania.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Chronić przed wilgocią.