

# Deflegmin, 75 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 10 szt.

Cena: 12,87 zł



## Opis słownikowy

Marka	Deflegmin
Postać	kapsułki
Producent	Bausch Health
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Ambroksol

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Deflegmin, 75 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 10 szt.

Deflegmin to produkt leczniczy o działaniu mukolitycznym, który poprawia transport zalegającej wydzieliny z dróg oddechowych i łagodzi kaszel mokry z towarzyszącą lepką wydzieliną.

### Skład Deflegmin, 75 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 10 szt.

Substancją czynną jest: ambroksol (Ambroxoli hydrochloridum).

1 kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 75 mg chlorowodoru ambroksolu.

Substancje pomocnicze: sacharoza ziarenka, skrobia kukurydziana, szelak, powidon, talk; kapsułka żelatynowa: erytrozyna (E 127), tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132), żelatyna.

### Działanie Deflegmin, 75 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 10 szt.

Deflegmin zawiera ambroksol w postaci chlorowodoru, który wykazuje działanie mukolityczne - zwiększa wydzielanie śluzu, poprawia jego transport. Efektem tego jest ułatwione odkrztuszanie. Deflegmin łagodzi kaszel.

## Wskazania Deflegmin, 75 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 10 szt.

Ostre i przewlekłe choroby płuc oraz oskrzeli przebiegające z utrudnionym odkrztuszaniem lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych.

## Dawkowanie Deflegmin, 75 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 10 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Leku nie stosować bezpośrednio przed snem ze względu na mechanizm działania leku.

Dorośli: 1 kapsułka na dobę, rano lub wieczorem, po jedzeniu, popijając niewielką ilością płynu.

## Przeciwwskazania Deflegmin, 75 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 10 szt.

Kiedy nie stosować leku Deflegmin:

w przypadku uczulenia na substancję czynną - ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, bezpośrednio przed snem.

## Informacje dodatkowe Deflegmin, 75 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 10 szt.

Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli występują: choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, zaburzona czynność wątroby lub nerek, osłabiony odruch kaszlowy lub zaburzenia oczyszczania rzęskowego oskrzeli, astma oskrzelowa.

W przypadku wystąpienia wysypki, stosowanie leku należy przerwać i skonsultować się z lekarzem.

Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych, występuje w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

Jeśli w ciągu stosowania leku (4-5 dni), objawy nasiliły się lub występuje brak poprawy, należy skonsultować się z lekarzem.

Lek zawiera sacharozę - stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.

Lek zawiera indygotynę, która może powodować reakcje alergiczne.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.