


Dentinox N, 15% + 0,34% + 0,32% żel na dziąsła, 10 g

Cena: 23,29 zł



Opis słownikowy

Postać	żel
Producent	Pharmapoint
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Makrogol

Opis produktu

Informacje podstawowe Dentinox N, 15% + 0,34% + 0,32% żel na dziąsła, 10 g

Dentinox N to produkt leczniczy do stosowania w podrażnieniu dziąseł i dolegliwościach bólowych związanych z ząbkowaniem, wyrzynaniem się zębów mlecznych.

Skład Dentinox N, 15% + 0,34% + 0,32% żel na dziąsła, 10 g

Substancjami czynnymi s?: nalewka z rumianku (*Chamomillae tinctura*), lidokaina (*Lidocaini hydrochloridum*), makrogol (*Macrogoli aether laurilicum*).

10 g ?elu zawiera 1500 mg nalewki z rumianku (1:4-4,5), ekstrahent: etanol 70% (v/v), 34 mg chlorowodoru lidokainy, 32 mg makrogolu eter laurylowy.

Substancje pomocnicze: karbomer (934 P), lewomentol, wersenian dwusodowy, sodu wodorotlenek 10%, polisorbata 20, glikol propylenowy, sól sodowa sacharyny, sorbitol ciek?y niekrystalizuj?cy, woda oczyszczona, ksylitol.

Zawarto?? etanolu w produkcji max 9,5%.

Działanie Dentinox N, 15% + 0,34% + 0,32% żel na dziąsła, 10 g

Dentinox N łagodzi objawy związane z ząbkowaniem - łagodzi podrażnienie dziąseł i dolegliwości bólowe.

Wskazania Dentinox N, 15% + 0,34% + 0,32% żel na dziąsła, 10 g

Bolesne wyrzynanie się zębów mlecznych z objawami podrażnienia i bólu.

Dawkowanie Dentinox N, 15% + 0,34% + 0,32% żel na dziąsła, 10 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania na dziąsła.

Lek do stosowania krótkotrwałego w ostrych objawach ząbkowania.

Żel na dziąsła Dentinox N może być stosowany przez cały okres wyrzynania się zębów mlecznych. To samo dotyczy wyrzynania się zębów trzonowych.

Lek stosować 2-3 razy dziennie. Niewielką ilość żelu (wielkość ziarnka grochu) wmasować w dziąsła - palcem lub patyczkiem bawełnianym. Żel aplikować szczególnie po jedzeniu lub po zabiegach higienicznych w jamie ustnej przed pójściem spać.

Przeciwwskazania Dentinox N, 15% + 0,34% + 0,32% żel na dziąsła, 10 g

Kiedy nie stosować leku Dentinox N:

w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
w przypadku nietolerancji rumianku lub innych roślin z rodziny Asteraceae (w tym reakcji krzyżowej), reakcji nadwrażliwości na rumianek (np. kontaktowe zapalenie skóry),
w przypadku nietolerancji lidokainy lub podobnych środków miejscowo znieczulających (typu amidowego),
w przypadku nietolerancji fruktozy.

Informacje dodatkowe Dentinox N, 15% + 0,34% + 0,32% żel na dziąsła, 10 g

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Podczas stosowania leku należy unikać kontaktu z oczami.

W przypadku pojawienia się silniejszego zaczerwienienia, obrzęku, reakcji nadwrażliwości, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować miejscowe podrażnienie.

Lek zawiera sorbitol, który nie powinien być stosowany w nietolerancji fruktozy.

Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.