

Dexeryl, krem emolient, 50 g



Cena: 21,39 zł

Opis słownikowy

Marka	Dexeryl
Postać	krem
Producent	Pierre Fabre
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Makrogol, Parafina, Wazelina

Opis produktu

Informacje podstawowe Dexeryl, krem emolient, 50 g

Dexeryl to wyrób medyczny w postaci kremu łagodzącego objawy suchej skóry, które często występują u osób dotkniętych atopowym zapaleniem, rybią łuską oraz rumieniem wywołanym radioterapią. Składniki produktu zostały dobrane tak, aby przywrócić skórze prawidłowy poziom jej nawilżenia. Dla osób dorosłych i dzieci od 1. dnia życia.

Skład Dexeryl, krem emolient, 50 g

Glycerol, White Soft Paraffin, Liquid Paraffin, Glycerol Monostearate, Stearic Acid, Dimethicone, Macrogol 600, Trolamine, Acrylamide/acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Polysorbate, Pentylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Carbomer, Purified Water.

Zawartość opakowania

Tubka z kremem 50 g

Działanie Dexeryl, krem emolient, 50 g

Krem Dexeryl tworzy na powierzchni skóry ochronną powłokę, która zapobiega utracie wody oraz chroni ją przed zewnętrznymi czynnikami drażniącymi. Dodatkowo, produkt nawilża skórę i łagodzi znajdujące się na niej podrażnienia. Dwa składniki, które znajdują się w produkcie – glicerol i wazelina zapewniają właściwości nawilżające i ochronne wyrobu.

Wskazania Dexeryl, krem emolient, 50 g

Produkt przeznaczony do stosowania na skórę suchą, ze skłonnościami do atopii.

Dawkowanie Dexeryl, krem emolient, 50 g

Stosować cienką warstwę na podrażnione miejsca 1-2 razy dziennie (maksymalnie, w razie konieczności do 6 razy na dobę).

Przeciwwskazania Dexeryl, krem emolient, 50 g

Nie stosować preparatu w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników kremu.
Z uwagi na brak wystarczających danych nie rekomenduje się jednoczesnej aplikacji kremu oraz innych produktów o działaniu miejscowym. W razie wątpliwości należy zapytać wykwalifikowanego personelu medycznego.

Informacje dodatkowe Dexeryl, krem emolient, 50 g

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Nie stosować na rany.
Nie połykać, unikać kontaktu z oczami.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami

Nie zaleca się równoczesnego stosowania kremu Dexeryl z innymi produktami o działaniu miejscowym.