

## Dezamigren, 12,5 mg tabletki powlekane, 2 szt.

Cena: 28,89 zł



### Opis słownikowy

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Postać            | tabletki        |
| Producent         | Aflofarm        |
| Rejestracja       | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | Almotryptan     |

### Opis produktu

### Informacje podstawowe Dezamigren, 12,5 mg tabletki powlekane, 2 szt.

Dezamigren to lek przeciwmigrenowy, który należy do grupy leków zwanych selektywnymi agonistami receptora serotoninowego. Substancja czynna leku - almotryptan - wiąże się z receptorami serotoninowymi w naczyniach krwionośnych w mózgu powodując ich zwężenie, co prowadzi do zmniejszenia reakcji zapalnej związanej z migreną.

### Skład Dezamigren, 12,5 mg tabletki powlekane, 2 szt.

Substancją czynną leku jest almotryptan w dawce 12,5 mg (w postaci almotryptanu jabłczanu).

Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: mannitol, celuloza mikrokryształiczna, powidon K 29/32, karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), sodu stearylofumarany; otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400.

### Wskazania Dezamigren, 12,5 mg tabletki powlekane, 2 szt.

Lek Dezamigren jest stosowany w doraźnym leczeniu bólu głowy związanego z ostrymi napadami migreny z aurą lub bez aury. Dezamigren należy stosować wyłącznie w celu leczenia występującego napadu migreny, a nie w celu zapobiegania napadom migreny lub bólowi głowy.

## Dawkowanie Dezamigren, 12,5 mg tabletki powlekane, 2 szt.

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Dezamigren można przyjmować jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Lek należy przyjmować z płynem.

Dorośli (w wieku od 18 do 65 lat)

Zalecana dawka to: jedna tabletka (12,5 mg).

Lek należy przyjąć najszybciej jak to możliwe po wystąpieniu napadu migreny.

Lek jest skuteczny także w przypadku przyjęcia w późniejszym stadium.

Jeżeli napad migreny nie ustąpi, pacjent nie powinien przyjmować więcej niż jedną tabletkę podczas tego samego napadu.

Jeśli u pacjenta wystąpi kolejny napad migreny w ciągu 24 godzin, można przyjąć drugą tabletkę w dawce 12,5 mg pod warunkiem zachowania przynajmniej 2-godzinnej przerwy pomiędzy przyjęciem pierwszej i drugiej tabletki.

Maksymalna dawka dobową to dwie tabletki (25 mg).

Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek, nie powinien przyjmować więcej niż jedną tabletkę (12,5 mg) w ciągu 24 godzin.

## Przeciwwskazania Dezamigren, 12,5 mg tabletki powlekane, 2 szt.

Jeśli pacjent ma uczulenie na almotryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek wystąpiła jakakolwiek choroba, która ogranicza dopływ krwi do serca, taka jak: zawał mięśnia sercowego, dusznica bolesna, ból lub dyskomfort w klatce piersiowej występujący zwykle po wysiłku fizycznym lub stresie, problemy z sercem bez towarzyszącego bólu, ból w klatce piersiowej występujący w trakcie spoczynku, ciężkie nadciśnienie tętnicze (bardzo wysokie ciśnienie krwi), niekontrolowane łagodne bądź umiarkowane wysokie ciśnienie krwi.

Jeśli pacjent miał udar mózgu lub zmniejszony dopływ krwi do mózgu.

Jeśli u pacjenta wystąpiła niedrożność w dużych naczyniach krwionośnych ramion lub nóg (choroba naczyń obwodowych).

Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie inne leki stosowane w leczeniu migreny zawierające ergotaminę, dihydroergotaminę czy metysergid lub inne leki z grupy agonistów serotoniny (np. sumatryptan).

Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby.

## Informacje dodatkowe Dezamigren, 12,5 mg tabletki powlekane, 2 szt.

### Dezamigren a ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dostępne są jedynie bardzo ograniczone informacje dotyczące zastosowania leku u kobiet w ciąży.

Leku Dezamigren nie należy stosować w okresie ciąży, chyba, że zostanie zalecony przez lekarza, który dokładnie rozważy bilans korzyści do ryzyka.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania tego leku w okresie karmienia piersią.

Należy unikać karmienia piersią przez 24 godziny po przyjęciu tego leku.

### Prowadzenie pojazdów

Dezamigren może powodować senność.

Jeśli u pacjenta wystąpi senność, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

### Przedawkowanie

Jeżeli pacjent przypadkowo przyjmie za dużo tabletek lub gdy lek przyjmie inna osoba lub dziecko, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.