

Diclac Lipogel, 10 mg/g żel, 50 g

Cena: 19,59 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-----------------|
| Marka | Diclac |
| Postać | żel |
| Producent | Sandoz |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | Diklofenak |

Opis produktu

Informacje podstawowe Diclac Lipogel, 10 mg/g żel, 50 g

Diclac LipoGel to produkt leczniczy do stosowania w urazach z towarzyszącym bólem i stanem zapalnym oraz innych zmianach zapalnych i dolegliwościach bólowych mięśni i stawów.

Skład Diclac Lipogel, 10 mg/g żel, 50 g

Substancj? czynn? jest: diklofenak (*Diclofenacum natricum*).

1 g ?elu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.

Substancje pomocnicze: RRR-alfa-tokoferol, karbomer 980 NF, decylu oleinian, 2-oktylododekanol, lecytyna, amonowy wodorotlenek 10%, disodu edetynian, olejek zapachowy „Vert de Creme”, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

Działanie Diclac Lipogel, 10 mg/g żel, 50 g

Diclac LipoGel zawiera diklofenak, który należy do grupy NLPZ - niesteroidowych leków przeciwbólowych. Diklofenak w podaniu miejscowym wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Dodatkowo Diclac LipoGel ma liposomalną formę, która ułatwia wchłanianie leku, a wodno-alkoholowe podłoże zapewnia działanie kojące i chłodzące.

Wskazania Diclac Lipogel, 10 mg/g żel, 50 g

pourazowe stany zapalne więzadeł, ścięgien, mięśni i stawów, których przyczyną mogą być skręcenia, stłuczenia, nadwyrężenia, ból pleców,
stany zapalne tkanek miękkich - zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe, łagodne postaci choroby zwyrodnieniowej stawów (jako wskazanie u osób powyżej 18 lat).

Dawkowanie Diclac Lipogel, 10 mg/g żel, 50 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania miejscowego na skórę.

Lek należy stosować jedynie na skórę nieuszkodzoną.

Podczas stosowania należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

Miejsce posmarowane można okryć bandażem, nie stosować opatrunku nieprzepuszczalnego dla powietrza.

Młodzież powyżej 14 lat i dorośli: żel aplikować 3-4 razy na dobę, delikatnie wetrzeć w skórę. Zwykle stosuje się 2-4 g żelu.

Długość stosowania leku zależy od wieku i schorzenia, wynosi odpowiednio:

dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 14 dni dla urazów mięśni i stawów (skręcenia, nadwyrężenia, stłuczenia) oraz zapalenia ścięgien,
dorośli: 21 dni w związku z chorobą zwyrodnieniową stawów.

Przeciwwskazania Diclac Lipogel, 10 mg/g żel, 50 g

Kiedy nie stosować leku Diclac LipoGel:

w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - diklofenak lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jeśli w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu lub innych leków stosowanych w leczeniu bólu stawów i mięśni,
w okresie III trymestru ciąży,
u osób poniżej 14 lat.

Informacje dodatkowe Diclac Lipogel, 10 mg/g żel, 50 g

Żel można stosować na nieuszkodzoną skórę. Nie stosować na skórę zmienioną chorobowo, otwarte rany, wypryski.

Jeśli po zastosowaniu leku wystąpi wysypka skórna, należy przerwać stosowanie leku.

Nie stosować długotrwale i na duże powierzchnie ciała.

Żelu nie stosować na błony śluzowe i należy unikać kontaktu z oczami.

W trakcie stosowania leku nie należy stosować opatrunków nieprzepuszczających powietrza (tzw. opatrunków okluzyjnych).

Lek może uwrażliwiać skórę na promieniowanie słoneczne, w związku z tym należy zachować ostrożność podczas opalania się lub korzystania z solarium.