Diclomax, 25 mg tabletki powlekane, 20 szt.

Cena: 10,09 zł

Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	Vitabalans
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Diklofenak

Opis produktu

Informacje podstawowe Diclomax, 25 mg tabletki powlekane, 20 szt.

Diclomax 25 mg należy do grupy leków znanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Skład Diclomax, 25 mg tabletki powlekane, 20 szt.

Działanie Diclomax, 25 mg tabletki powlekane, 20 szt.

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Wskazania Diclomax, 25 mg tabletki powlekane, 20 szt.

Objawowe leczeniu ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, w tym:

bólów mięśni i stawów,
bólów reumatycznych,
bólu zęba,

bólu pleców i kręgosłupa,
bolesnego miesiączkowania.

Dawkowanie Diclomax, 25 mg tabletki powlekane, 20 szt.

Dorośli: 1 tabletka powlekana (25 mg) co 4 do 6 godzin.
Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 tabletki.
Tabletki należy przyjmować, popijając płynem.
Tabletek nie należy przyjmować podczas posiłków lub bezpośrednio po posiłkach.
Tabletki można dzielić na równe dawki.

Nie stosować dłużej niż 5 dni w leczeniu bólu bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania Diclomax, 25 mg tabletki powlekane, 20 szt.

Kiedy nie stosować leku Diclomax

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli u pacjenta występuje, lub występował, wrzód żołądka lub dwunastnicy
jeśli u pacjenta występuje lub występowało krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacje związane z wcześniejszym stosowaniem leków przeciwbólowych (NLPZ)
jeśli u pacjenta występuje zwiększona tendencja do krwawień
jeśli pacjent ma poważne zaburzenia czynności wątroby
jeśli u pacjenta występuje porfiria (choroba metaboliczna)
jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę serca i (lub) chorobę naczyń mózgowych np. po przebyciu zawału serca, udaru, mini-udaru (przejściowego niedokrwienia mózgu) lub zatoru naczyń krwionośnych serca, lub mózgu, albo zabiegu udrożnienia, lub pomostowania zamkniętych naczyń
jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia krążenia (choroba naczyń obwodowych)
jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek
podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży
jeśli u pacjenta wystąpiły wcześniej reakcje alergiczne, tj. astma, kichanie lub wysypka po zastosowaniu leków przeciwbólowych zawierających kwas acetylosalicylowy lub innych leków przeciwbólowych lub przeciwzapalnych z grupy NLPZ (niesteriodowe leki przeciwzapalne)

Informacje dodatkowe Diclomax, 25 mg tabletki powlekane, 20 szt.

Ciąża i laktacja
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Nie wolno stosować leku Diclomax podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży. Stosowanie leku Diclomax w jakiejkolwiek innej fazie ciąży może mieć miejsce jedynie na zalecenie lekarza.

Karmienie piersią
Diklofenak przenika do mleka matki. Zatem lek Diclomax nie powinien być stosowany w czasie karmienia piersią, w celu uniknięcia działań niepożądanych u dziecka.

Płodność
Diklofenak może utrudniać zajście w ciążę. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka planuje zajść w ciążę lub jeśli masz problemy z zajściem w ciążę.

Prowadzenie pojazdów

Jeśli u pacjenta wystąpią zawroty głowy, senność, zmęczenie lub zaburzenia widzenia podczas stosowania leku Diclomax, powinien powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Następujące leki mogą wchodzi w interakcje z lekiem Diclomax, na przykład:

leki przeciwzakrzepnowe krwi (warfaryna, tyklopidyna, kwas acetylosalicylowy, heparyna itp.)
metotreksat (lek anytynowotworowy i przeciw zaburzeniom układu immunologicznego)
leki stosowane w leczeniu cukrzycy, poza insuliną
lit (stosowany w leczeniu psychozy maniakalno-depresyjnej)
selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (stosowane w depresji)
digoksyna (stosowana w leczeniu chorób serca)
takrolimus (stosowany w transplantacji i leczeniu egzemy)
cyklosporyna (stosowana podczas procesu transplantacji, w leczeniu ostrej łuszczycy i reumatyzmu)
leki na nadciśnienie (leki beta-adrenolityczne, antagonistów receptorów angiotensyny II, inhibitory ACE)
leki moczopędne (leki stymulujące produkcję moczu i stosowane w celu obniżenia ciśnienia krwi)
antybiotyki chinolonowe (stosowane w leczeniu infekcji układu moczowego)
zydowudyna (stosowany w leczeniu zakażeń HIV)
kortykosteroidy (stosowane w leczeniu chorób zapalnych)
kolestypol i cholestyramina (stasowane w celu obniżenia zbyt dużego stężenia tłuszczy we krwi).

Leki te mogą być stosowane z lekiem Diclomax, pod warunkiem, że przyjmowane są z zachowaniem kilkugodzinnej przerwy.

flukonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych)
ryfampicyna (antybiotyki stosowane w gruźlicy)
karbamazepina (stosowana w epilepsji)
barbiturany (środki nasenne)
diazepam (lek uspokajający)
pentoksyfilina (środek rozszerzające naczynia krwionośne)
fenytoina (stosowana w leczeniu epilepsji)

Nie należy stosować różnych środków uśmierzających ból w tym samym czasie bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Diclomax i powiadomić o tym lekarza w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych:

agranulocytoza (objawy: gorączka, ból gardła, bolesne owrzodzenia jamy ustnej, owrzodzenie odbytu, zmniejszona odpowiedź immunologiczną, skłonność do infekcji bakteryjnych).
zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (choroby skórne zagrażające życiu, które powodują wysypkę, łuszczycę i owrzodzenie błon śluzowych).
reakcje nadwrażliwości (zwężenie i niedrożność dróg oddechowych, pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny ze spadkiem ciśnienia).
należy przerwać stosowanie leku Diclomax i natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności z przełykaniem, pokrzywka i trudności w oddychaniu.
łagodne bolesne skurcze i tkliwość brzucha, rozpoczynające się wkrótce po rozpoczęciu stosowania leku Diclomax, po których wystąpią krwawienia z odbytu lub krwawa biegunka, na ogół w ciągu 24 godzin od pojawienia się bólu brzucha (częstość nieznana – nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić:

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

ból brzucha
nudności
wymioty
biegunka
problemy trawienne
zmniejszenie apetytu
nadmiar gazów
ból głowy
zawroty głowy
wysypka
podwyższona wartość wskaźników wątrobowych.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1, 000 osób):
egzema, rumień
reakcje nadwrażliwości (zwężenie i niedrożność dróg oddechowych, pokrzywka, szokowa reakcja alergiczna ze spadkiem ciśnienia tętniczego)
zapalenie żołądka, krwawienie lub wrzody w drogach pokarmowych (może występować krew w kale lub wymiotach)
zaburzenia czynności wątroby (w tym zapalenie wątroby z lub bez zażółcenie skóry)
zmęczenie
astma (zadyszka, duszność)
obrzęk ciała wskutek zatrzymania płynów.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10, 000 osób):
pęcherze na skórze
redukcja ilości niektórych komórek krwi (czerwone krwinki, płytki krwi i neutrofile)
gwałtowny obrzęk tkanek skórnych i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)
dezorientacja, depresja, bezsenność, koszmary senne, drażliwość, zaburzenia poczucia rzeczywistości
uczucie pieczenia lub kłucia skóry bez widocznych fizycznych skutków (parestezje), zaburzenia pamięci, drgawki, niepokój, niekontrolowane ruchy mięśni (drżenie), zaburzenia smaku, udar mózgu
zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie, podwójne widzenie) i słuchu (redukcja słyszenia, szum w uszach)
wpływ na serce i naczynia krwionośne (taki jak kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego)
wysokie ciśnienie krwi
zapalenie naczyń krwionośnych
zapalenie płuc
choroby jelita grubego, zaparcia, zapalenie języka, jamy ustnej lub przełyku
zapalenie trzustki
zapalenie powłok mózgu (zapalenie opon mózgowych)
ostra niewydolność wątroby
wypadanie włosów
nadwrażliwość na światło
ostra niewydolność nerek
wpływ na nerki (który może prowadzić do zmniejszenia lub zatrzymania produkcji moczu i krwi w moczu).

Wystąpić mogą szczególne poważne infekcje skórne w przypadku ospy wietrznej.