Difortan, 100 mg/g żel, 100 g

Cena: 43,19 zł

Opis słownikowy

Marka	Difortan
Postać	żel
Producent	Us Pharmacia
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Etofenamat

Opis produktu

Informacje podstawowe Difortan, 100 mg/g żel, 100 g

Difortan jest lekiem w postaci żelu, przeznaczonym do wcierania w skórę o działaniu przeciwbólwym i przeciwzapalnym.

Skład Difortan, 100 mg/g żel, 100 g

Substancją czynną jest etofenamat (Etofenamat).

1 g żelu zawiera 100 mg etofenamatu.

Substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy, glicerol, trolamina, karbomery, woda oczyszczona.

Działanie Difortan, 100 mg/g żel, 100 g

Lek Difortan działa przeciwbólowo, przeciwzapalanie i przeciwobrzękowo.

Wskazania Difortan, 100 mg/g żel, 100 g

Stosowany jest w miejscowym leczeniu:

stłuczeń,
łagodnych i umiarkowanych bólów mieśni,
bólu pourazowego,
łagodnego i umiarkowanego bólu bólu reumatycznego,
łagodnego i umiarakowanego bólu stawów,
zapalenia stawów, zapalenia kaletki, zapalenia ścięgien.

Dawkowanie Difortan, 100 mg/g żel, 100 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie Difortanu:

Przed i po użyciu preparatu należy umyć ręce.
Lek należy rozprowadzić na bolący obszar poprzez delikatne wcieranie.
Jeśli objawy nie miną po 7 dniach lub nastąpi ich pogorszenie, to należy zgłosić się do lekarza.

Stłuczenia, naciągnięcia, zwichnięcia: od 3 do 4 aplikacji na dobę
choroby reumatyczne: od 2 do 3 aplikacji na dobę

Przeciwwskazania Difortan, 100 mg/g żel, 100 g

Kiedy nie stosować leku Difortan:

w przypadku uczulenia na substancję czynną lub pomocniczną,
u kobiet w ciąży,
na uszkodzoną lub zakażoną skórę, w tym obszary skóry z ranami i wypryskiem,
u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Informacje dodatkowe Difortan, 100 mg/g żel, 100 g

Difortan jest ważny do 6 mięsięcy po pierwszym otwarciu.
Chronić posmarowaną skórę przed światłem słonecznym.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Difortan może zmienić działanie innych przyjmowanych leków. Aby to nastąpiło, Difortan, nakładany na skórę, musi zostać wchłonięty do krwiobiegu. Ponieważ lek Difortan wchłania się w nieznacznej ilości do krwiobiegu, jest mało prawdopodobne, że będzie wpływał na działanie innych leków.

Lek Difortan może wpływac na działanie:

leków stosowanych w celu kontrolowania ciśnienia krwi, w tym leków moczopędnych,
leków stosowanych w celu rozcieńczania krwi,
litu.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się

lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Difortan nie może być stosowany u kobiet w ciąży lub w przypadku podejrzenia ciąży.
Difortan może być stosowany przez kobiety w okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Prawdopodobieństwo, że użycie leku Difortan wpłynie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jest niewielkie.

Galeria