

Diosminex Max, 1000 mg tabletki powlekane, 30 szt

Cena: 52,09 zł



Opis słownikowy

Marka	Diosminex
Postać	tabletki
Producent	Bausch Health
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Diosmina

Opis produktu

Informacje podstawowe Diosminex Max, 1000 mg tabletki powlekane, 30 szt

Diosminex Max to produkt leczniczy do stosowania w przypadku uczucia ciężkości nóg, bólu nóg, nocnych kurczy i zaostrzenia hemoroidów. Diosminex wspomaga ochronę naczyń krwionośnych i zwiększa ich napięcie.

Skład Diosminex Max, 1000 mg tabletki powlekane, 30 szt

Substancj? czynn? jest: diosmina (*Diosminum*).

1 tabletka zawiera 1000 mg diosminy.

Substancje pomocnicze: *rdze? tabletki:* celuloza mikrokryształiczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; *otoczka:* alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk, lak ?ó?cieni chinolinowej (E 104), lak indygotyny (E 132), lak ?ó?cieni pomarańczowej (E 110), ?elaza tlenek czarny (E 172).

Działanie Diosminex Max, 1000 mg tabletki powlekane, 30 szt

Diosminex Max zawiera diosminę, która zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia. Diosmina zmniejsza rozrzerzalność żył i zastój żylny. Odnośnie naczyń włosowatych - zmniejsza ich przepuszczalność i zwiększa opór.

Wskazania Diosminex Max, 1000 mg tabletki powlekane, 30 szt

Diosminex MAX jest wskazany:

w leczeniu objawów przewlekłej niewydolności żylniej u osób dorosłych, jak:

- żylaki kończyn dolnych
- owrzodzenia żylne
- eleangiektazje (pajęczki) i żylaki (żyły siatkowate)
- uczucie ciężkości, zmęczenia, dyskomfortu lub niespokojnych nóg
- ból nóg lub uczucie pieczenia nóg;
- uczucie zimnych nóg
- nocne kurcze nóg
- obrzęk kończyn dolnych
- swędzenie i parestezje (mrowienie, kłucie lub swędzenie skóry kończyn dolnych)
- zaczerwienienie (rumień) lub zasinienie skóry

w leczeniu objawowym w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu u osób dorosłych.

Przeciwwskazania Diosminex Max, 1000 mg tabletki powlekane, 30 szt

Lek Diosminex MAX a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Diosmina może zwiększać stężenie we krwi i obniżać wydalanie:

- metronidazolu (lek o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwpierwotniakowym);
- diklofenaku (lek przeciwbólowy i przeciwzapalny)
- feksofenadyny (lek przeciwhistaminowy)
- warfaryny (lek przeciwzakrzepowy)
- karbamazepiny (lek przeciwpadaczkowy)

Informacje dodatkowe Diosminex Max, 1000 mg tabletki powlekane, 30 szt

W przypadku łagodnych działań niepożądanych, dotyczących żołądka i jelit, oraz zaburzeń neurovegetatywnych (np. wzmożony niepokój, przyspieszone bicie serca, nadmierna potliwość, lękliwość) nie jest wymagane odstawienie leku.

W przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że terapia lekiem Diosminex Max jest tylko objawowa i powinna być krótkotrwała. Jeżeli dolegliwości nie ustępują, należy przeprowadzić badanie u lekarza proktologa, który wybierze odpowiednią metodę leczenia.

Przyjmowanie tego leku w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu nie wyklucza jednoczesnego stosowania doodbytniczo innych leków.

W przypadku zaburzeń krążenia żylnego w nogach, działanie terapeutyczne leku Diosminex Max można zwiększyć poprzez odpowiedni tryb życia: unikanie ekspozycji słonecznej, unikanie przebywania w pozycji stojącej przez dłuższy czas, utrzymanie odpowiedniej wagi ciała, noszenie specjalnych pończoch.

Jeżeli objawy choroby ulegają pogorszeniu tzn. obserwuje się stan zapalny skóry, stan zapalny żył, stwardnienie tkanki podskórnej, silny ból, owrzodzenia skóry lub gdy występują objawy nietypowe na przykład natychmiastowy obrzęk jednej lub obydwu nóg, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Diosminex Max nie działa w przypadku, gdy obrzęki podudzi są spowodowane chorobami serca, nerek lub wątroby.

Lek zawiera laktozę - stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.

Lek zawiera żółcień pomarańczową (E 110), która może powodować reakcje alergiczne.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria

DIOSMINEX MAX
Diosminum

Pierwszy w Polsce

JEDEN LEK na wszystkie objawy przewlekłej niewydolności żyłnej (PNŻ)

Wystarczy 1 tabletka dziennie!

30 tabletek powlekanych

TO JEST LEK. DLA BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ GO ZGODNIE Z ULOTKĄ DOŁĄCZONĄ DO OPAKOWANIA. NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEJ DAWKI LEKU. W PRZYPADKU WĄTPLIWOSCI SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ.

DIOSMINEX MAX
Diosminum

ROZSZERZONE WSKAZANIA

- ból nóg
- obrzęk kończyn dolnych
- żylaki kończyn dolnych
- pajęczaki naczyniowe
- żyloty siarkowate
- owrzodzenia żyłne

Leczy objawy przewlekłej niewydolności żyłnej (PNŻ)

TO JEST LEK. DLA BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ GO ZGODNIE Z ULOTKĄ DOŁĄCZONĄ DO OPAKOWANIA. NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEJ DAWKI LEKU. W PRZYPADKU WĄTPLIWOSCI SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ.

DIOSMINEX MAX
Diosminum

Diosminex Max jest wskazywany do stosowania we wszystkich stopniach zaawansowania przewlekłej niewydolności żyłnej (PNŻ) (C0-C6 wg klasyfikacji CEAP)*

Stopień zaawansowania	Objawy	Wskazania
C0	Brak widocznych zmian	Wzrost
C1	Wzrost	Wzrost
C2	Żylaki	Żylaki
C3	Obrzęk	Obrzęk
C4	Żółtaczka	Żółtaczka
C5	Wzrost	Wzrost
C6	Wzrost	Wzrost

TO JEST LEK. DLA BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ GO ZGODNIE Z ULOTKĄ DOŁĄCZONĄ DO OPAKOWANIA. NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEJ DAWKI LEKU. W PRZYPADKU WĄTPLIWOSCI SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ.

Skuteczność leku DIOSMINEX potwierdzona badaniami

Wielosrodkowe badanie obserwacyjne, obejmujące grupę 6 539 polskich pacjentów.

BADANIA KLINICZNE

Terapia lekiem Diosminex wiązała się z redukcją obwodu kostki o 0,9 cm

TO JEST LEK. DLA BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ GO ZGODNIE Z ULOTKĄ DOŁĄCZONĄ DO OPAKOWANIA. NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEJ DAWKI LEKU. W PRZYPADKU WĄTPLIWOSCI SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ.

DIOSMINEX MAX wspiera aż 9 kluczowych obszarów układu krwionośnego nóg^{1,2,3,4,5}

1. Zwiększa przepływność krwi
2. Zwiększa przepływność krwi
3. Zwiększa przepływność krwi
4. Zwiększa przepływność krwi
5. Zwiększa przepływność krwi
6. Zwiększa przepływność krwi
7. Zwiększa przepływność krwi
8. Zwiększa przepływność krwi
9. Zwiększa przepływność krwi

TO JEST LEK. DLA BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ GO ZGODNIE Z ULOTKĄ DOŁĄCZONĄ DO OPAKOWANIA. NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEJ DAWKI LEKU. W PRZYPADKU WĄTPLIWOSCI SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ.

Wybierz opakowanie dostosowane do swoich potrzeb:

Na 1 miesiąc stosowania!

Na 2 miesiące stosowania!

DIOSMINEX MAX

TO JEST LEK. DLA BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ GO ZGODNIE Z ULOTKĄ DOŁĄCZONĄ DO OPAKOWANIA. NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEJ DAWKI LEKU. W PRZYPADKU WĄTPLIWOSCI SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ.