

Drotafemme, 40 mg, tabl.powl., 20 szt



Cena: 5,91 zł

Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	Sun-Farm

Opis produktu

Skład Drotafemme, 40 mg, tabl.powl., 20 szt

Każda tabletkę powlekana zawiera 40 mg chlorowodoru drotaweryny (Drotaverini hydrochloridum).

Działanie Drotafemme, 40 mg, tabl.powl., 20 szt

- Stany skurczowe mięśni gładkich, związane z chorobami dróg żółciowych: kamica dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vater; stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz.
- Jako leczenie wspomagające można stosować bezpiecznie i z pożądanym skutkiem: w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym, wzdęciach jelit i zapaleniu trzustki; w schorzeniach ginekologicznych: w bolesnym miesiączkowaniu.

Dawkowanie Drotafemme, 40 mg, tabl.powl., 20 szt

- Dawka dobową dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat wynosi 80mg, w 2 dawkach podzielonych, dla dzieci w wieku powyżej 12 lat dawka dobową wynosi 160mg, w 2 - 4 dawkach podzielonych.
- Dawka dobową dla dorosłych: 120 do 240 mg, w 2 - 3 dawkach podzielonych.
- Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku przez okres dłuższy niż 7 dni.

Przeciwwskazania Drotafemme, 40 mg, tabl.powl., 20 szt

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca, blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia.
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Informacje dodatkowe Drotafemme, 40 mg, tabl.powl., 20 szt

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań

niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.