

Effergalgen Forte, 1 g tabletki musujące, 8 szt (import równoległy, Delfarma)



Cena: 11,29 zł

Opis słownikowy

Marka	Effergalgen
Postać	tabletki musujące
Producent	Delfarma
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Paracetamol

Opis produktu

Informacje podstawowe Effergalgen Forte, 1 g tabletki musujące, 8 szt (import równoległy, Delfarma)

Tabletki musujące Effergalgen Forte to lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Effergalgen forte stosuje się w gorączce oraz bólach różnego pochodzenia, np. ból menstruacyjny, ból kostno-stawowy, nerwoból. Produkt pochodzi z importu równoległego.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej o produktach z importu równoległego

Skład Effergalgen Forte, 1 g tabletki musujące, 8 szt (import równoległy, Delfarma)

Substancją czynną leku jest paracetamol (Paracetamolum).

1 tabletki musująca zawiera 1000 mg paracetamolu.

Substancje pomocnicze: bezwodny kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu, bezwodny węglan sodu, sorbitol, dokuzynian sodu, powidon, sacharyna sodowa, benzoesan sodu.

Działanie Efferalgan Forte, 1 g tabletki musujące, 8 szt (import równoległy, Delfarma)

Substancją czynną tabletek musujących Efferalgan Forte jest paracetamol, który powoduje zmniejszenie gorączki w czasie choroby, ale nie obniża temperatury prawidłowej. Paracetamol w mniejszym stopniu niż salicylany podrażnia błonę śluzową żołądka. Lek wykazuje także działanie przeciwbólowe.

Wskazania Efferalgan Forte, 1 g tabletki musujące, 8 szt (import równoległy, Delfarma)

Wskazaniami do stosowania tabletek musujących Efferalgan Forte są bóle różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne) czy gorączka.

Dawkowanie Efferalgan Forte, 1 g tabletki musujące, 8 szt (import równoległy, Delfarma)

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie, po uprzednim rozpuszczeniu tabletki musującej w szklance wody. W przypadku osób dorosłych nie należy stosować leku dłużej niż 5 dni, a przy gorączce nie dłużej niż 3 dni, bez konsultacji z lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Efferalgan Forte dla dorosłych i dzieci o masie ciała większej niż 50 kg (w wieku powyżej 15 lat) to 1 tabletki musującej co 4–6 godzin. Maksymalna dawka dobową wynosi 4 tabletki musujące na dobę.

Przeciwwskazania Efferalgan Forte, 1 g tabletki musujące, 8 szt (import równoległy, Delfarma)

Nie stosować leku Efferalgan Forte u osób uczulonych na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek, choroba alkoholowa, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej. Lek przeznaczony dla osób o masie ciała powyżej 50 kg.

Informacje dodatkowe Efferalgan Forte, 1 g tabletki musujące, 8 szt (import równoległy, Delfarma)

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Efferalgan Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 1000, ale u ponad 1 na 10 000 leczonych pacjentów): złe samopoczucie, obniżenie ciśnienia krwi, zwiększona aktywność amino-transferaz wątrobowych.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10000 leczonych pacjentów): reakcje nadwrażliwość, częstoskurcz, biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek), neutropenia (zmniejszenie liczby neutrofilów - typu białych krwinek), spadek lub wzrost wartości INR (współczynnik krzepliwości krwi).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Efferalgan Forte zawiera paracetamol, więc należy zwrócić uwagę czy inne stosowane leki także nie zawierają tej substancji, aby uniknąć przedawkowania.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku: zaburzenia czynności wątroby, w tym zespół Gilberta (rodzina hiperbilirubinemia), zaburzenia czynności nerek, choroby alkoholowej, nadmiernego spożycie alkoholu (przyjmowanie 3 lub więcej napojów alkoholowych codziennie), anoreksji, bulimii lub wyniszczenia organizmu, długotrwałe niedożywienie, małych rezerw glutationu w wątrobie (związane z np. zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażeniem wirusem HIV, u pacjentów głodzonych lub wyniszczonych, z posocznicą), odwodnienia organizmu, hipowolemii (zmniejszona objętość krwi krążącej).

1 tabletkę musującą zawiera 567 mg sodu, na co powinni zwrócić uwagę pacjenci ze zmniejszoną czynnością nerek i kontrolujący zawartość sodu w diecie.

Ten lek zawiera sorbitol, więc pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Efferalgan Forte może wchodzić w interakcje z:

inhibitorami MAO (zwłaszcza jeśli były stosowane przez ostatnie 14 dni),
lekami zawierającymi salicylamid,
lekami zwiększającymi metabolizm wątrobowy (np. ziele dziurawca, leki przeciwpadaczkowe, barbiturany, ryfampicyna),
izoniazydem i zydowudyną,
niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ),
doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi,
fenytoiną,
probencydem.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu ani przyjmować leków zawierających alkohol, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Wpływ na badania laboratoryjne

Należy poinformować lekarza o stosowaniu tego leku, jeśli lekarz zleci pacjentowi wykonanie badania stężenia kwasu moczowego lub cukru we krwi.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat.