


EnterosGel, żel do stosowania wewnętrznego, 225 g



Cena: 122,09 zł

Opis słownikowy

Postać	żel
Producent	K&K HERBAL POLAND
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe EnterosGel, żel do stosowania wewnętrznego, 225 g

Doustny jelitowy adsorbent (enterosorbent). Wiąże niektóre toksyczne i szkodliwe substancje w jelicie, tym samym obniża częstość oddawania stolca oraz skraca utrzymywanie się biegunki. Przeznaczony do leczenia objawowego ostrej biegunki i chronicznej biegunki w zespole drażliwego jelita (IBS).

Skład EnterosGel, żel do stosowania wewnętrznego, 225 g

Polymethylsiloxane polyhydrate (hydrożel kwasu metylokrzemowego) 70%, woda oczyszczona 30%.

Nie zawiera konserwantów, barwników, glutenu, tłuszczów, cukru, laktozy, aromatów, składników pochodzenia roślinnego ani zwierzęcego.

Działanie EnterosGel, żel do stosowania wewnętrznego, 225 g

Wyrób medyczny Enterosgel to doustny jelitowy adsorbent (enterosorbent). Działa na bazie minerału organicznego ze zdolnością adsorpcyjną. Wiąże niektóre toksyczne i szkodliwe substancje w jelicie (takich jak endotoksyny, enterotoksyny) i tym samym obniża częstość oddawania stolca oraz skraca utrzymywanie się biegunki. Enterosgel jest wydalany z organizmu ze stolcem i w ten sposób usuwa toksyny i substancje szkodliwe, co może przynosić korzystne efekty w leczeniu stanów ostrej biegunki i przewlekłej biegunki w zespole drażliwego jelita.

Wskazania EnterosGel, żel do stosowania wewnętrznego, 225 g

Enterosgel to preparat przeznaczony do leczenia objawowego ostrej biegunki i chronicznej biegunki w zespole drażliwego jelita (IBS).

Dawkowanie EnterosGel, żel do stosowania wewnętrznego, 225 g

Należy przyjmować 2 godziny przed lub po zażyciu leków doustnych.

Stosować przez 3 do 5 dni podczas ostrej biegunki i przez okres do 21 dni w razie przewlekłej biegunki.

Wyrób zużyć w ciągu 30 dni po otwarciu tuby

Dzieci od 1. do 3. roku życia: przed podaniem wyrobu należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci od 4. do 6. roku życia: 5 g (ok. 1 łyżeczka od herbaty) rozprowadzić w 50-100 ml wody, podawać 3 razy dziennie.

Dorośli i dzieci powyżej 15 lat: 15 g – 22,5 g (ok. 1 łyżka stołowa) rozprowadzić w 50-100 ml wody, podawać 3 razy dziennie.

Nie przekraczać zalecanego okresu leczenia i nie stosować razem z posiłkami, tak aby nie nastąpił ewentualny niedobór witamin lub składników odżywczych.

W początkowej fazie leczenia (w pierwszym dniu) można podwoić pierwszą dawkę, a następnie podawać poszczególne dawki po każdym stolcu, 3 do 6 razy dziennie. Nie przekraczać 8 dawek w pierwszym dniu.

Należy przerwać leczenie jeżeli w ciągu 1-2 dni nie pojawi się stolec i zwiększyć ilość wypijanej wody, a następnie podjąć leczenie po kolejnym stolcu.

W leczeniu przewlekłej biegunki dawkowanie można dostosować do konsystencji i częstotliwości oddawania stolca. Można podać nawet podwójną dawkę 3 razy dziennie, jeżeli stolec jest rzadki lub obniżyć dawkę do 1 podania dziennie w przypadku normalnego stolca. Nie należy przekraczać 6 dawek dziennie.

Informacje dodatkowe EnterosGel, żel do stosowania wewnętrznego, 225 g

Nie należy stosować wyrobu medycznego u osób stosujących jednocześnie leki doustne o modyfikowanym (kontrolowanym) uwalnianiu, u osób cierpiących na atonię jelit (poważne zaparcia wywołane przez obstrukcję jelit) lub niedrożność jelit oraz u osób z nietolerancją preparatu stosowanego w przeszłości.

Nie należy używać wyrobu w razie ostrego zatrucia chemicznego, zatrucia lekami lub w razie przedawkowania leków.

Nie używać po upływie daty ważności.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze od **4°C do 30°C**.

Nie narażać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredni kontakt z promieniami słońca.

Tubę należy dobrze wstrząsnąć przed otwarciem i przed każdym użyciem.

Zużyć w ciągu 30 dni po otwarciu tuby.