


Erdomed Muko, 225 mg, lek na kaszel mokry i zatłkane zatoki, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 10 saszetek



Cena: 13,79 zł

Opis słownikowy

Postać	proszek
Producent	Angelini
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Erdosteina

Opis produktu

Informacje podstawowe Erdomed Muko, 225 mg, lek na kaszel mokry i zatłkane zatoki, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 10 saszetek

Erdomed Muko to lek z erdosteina dostępnym bez recepty, stosowany w celu rozrzedzenia i ułatwienia wykrztuszenia śluzowej wydzieliny z dróg oddechowych. Erdomed Muko jest przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia jako lek wspomagający w leczeniu ostrych i przewlekłych chorób zapalnych dróg oddechowych:

- nosa,
- zatok,
- krtani,
- tchawicy,
- oskrzeli,
- płuc

z towarzyszącym nadmiernym wydzielaniem śluzu.

Erdomed Muko zawiera najnowszą⁽¹⁾ substancję leczniczą ERDOSTEINĘ, która należy do grupy leków mukolitycznych ułatwiających wykrztuszenie wydzieliny.

Erdosteina wykazuje szerokie spektrum działania:

- Zmniejsza gęstość i lepkość wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych, jednocześnie poprawiając jej transport rzęskowy. Dzięki temu łatwiej odkrztusić zalegający śluz.
- Zmniejsza przyleganie bakterii do nabłonka dróg oddechowych, dzięki czemu minimalizuje ryzyko rozwoju infekcji bakteryjnej.

- Działa **antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie**.
- **Zmniejsza częstość i natężenie uporczywego kaszlu**.
- Zwiększa stężenie antybiotyku w wydzielinie, co **poprawia efektywność antybiotykoterapii**.

Erdomed Muko ma formę PROLEKU. Oznacza to, że jest bezpieczny dla żołądka. Erdosteina nie wywiera wpływu na błonę śluzową żołądka, więc lek może być bezpiecznie stosowany u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka. Erdomed Muko ma wygodną formę saszetek z proszkiem do przygotowania roztworu o pomarańczowym smaku. Płynna forma produktu dodatkowo nawodni organizm.

(1) IQVIA, Dataview, R05C, 2020

Skład Erdomed Muko, 225 mg, lek na kaszel mokry i zatłkane zatoki, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 10 saszetek

Substancją czynną leku jest erdosteina. Jedna saszetka zawiera 225 mg erdosteiny.

Pozostałe składniki to: sacharoza, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemu dwutlenek, sukraloza (E 955), kwas jabłkowy bezwodny, aromat pomarańczowy [maltodekstryna kukurydziana, substancje aromatyzujące (w tym, między innymi cytral, alkohol benzylowy, linalol), α -tokoferol (E 307)].

Postać farmaceutyczna: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej.

Dawkowanie Erdomed Muko, 225 mg, lek na kaszel mokry i zatłkane zatoki, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 10 saszetek

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Stosowanie u dzieci od 12. roku życia: 1 saszetka 2 razy na dobę.

Stosowanie u dorosłych: 1 saszetka 2 lub 3 razy na dobę.

Nie jest wymagane korygowanie dawek u dorosłych w przypadku zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Stosowanie leku Erdomed Muko u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Nie jest wymagane korygowanie dawek u dorosłych w przypadku umiarkowanej niewydolności nerek (klirens kreatyniny >25 ml/min).

Stosowanie leku Erdomed Muko u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Sposób użycia

Zawartość saszetki wsypać do ok. 120 ml (pół standardowej szklanki) wody o temperaturze pokojowej, w razie potrzeby zamieszać do uzyskania rzadkiej, mętnej zawiesiny. Stosować doustnie, bezpośrednio po przygotowaniu, według powyższego schematu dawkowania. Leku nie należy stosować przed snem ze względu na utrudnione odkrztuszenie rozrzedzonej wydzieliny podczas snu.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania Erdomed Muko, 225 mg, lek na kaszel mokry i zatłkane zatoki, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 10 saszetek

Kiedy nie stosować leku Erdomed Muko:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, którykolwiek z pozostałych składników tego leku (Sacharoza, Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), Krzemu dwutlenek, Sukraloza (E 955), Kwas jabłkowy bezwodny, Aromat pomarańczowy [maltodekstryna kukurydziana, substancje aromatyzujące (w tym, między innymi cytral, alkohol benzylowy, linalol), α -tokoferol (E 307)], albo na substancje zawierające wolne grupy SH (np.: acetylocysteinę);

- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby;
- jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek (klirens kreatyniny
- jeśli u pacjenta występuje homocystynuria (genetycznie uwarunkowana choroba metaboliczna polegająca na nieprawidłowym metabolizmie aminokwasu metioniny);
- u dzieci poniżej 12. roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Erdomed Muko należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wystąpienia typowych objawów nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka) należy natychmiast przerwać leczenie.

Ostrożnie stosować u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego (ze względu na ryzyko nagromadzenia dużych ilości śluzu).

Dzieci

Leku nie należy podawać dzieciom poniżej 12. roku życia.

Lek Erdomed Muko a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie obserwowano klinicznie istotnych, niekorzystnych interakcji z innymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń dróg oddechowych i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, takimi jak: teofilina, leki powodujące rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli (kortykosteroidy), erytromycyna, amoksycylina lub kotrimoksazol.

Po podaniu erdosteiny wykazano zwiększenie stężenia amoksycyliny w drogach oddechowych.

Leku Erdomed Muko nie należy stosować z lekami przeciwkaszlowymi, gdyż mogą one osłabiać odruch kaszlu i utrudniać odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny.

Lek Erdomed Muko z jedzeniem i picciem

Jedzenie i picie nie wpływa na wchłanianie leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Erdomed Muko nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Sacharoza

Lek zawiera 3,5 g sacharozy w jednej saszetce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Glukoza (wchodząca w skład maltodekstryny)

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Alkohol benzylowy

Lek zawiera 0,01 mg alkoholu benzylowego w każdej saszetce. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz pacjenci z chorobami wątroby lub nerek powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, gdyż duża ilość alkoholu benzylowego może gromadzić się w ich organizmie i powodować działania niepożądane (tzw. kwasicę metaboliczną).

Sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na saszetkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Informacje dodatkowe Erdomed Muko, 225 mg, lek na kaszel mokry i zatłkane zatoki,

proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 10 saszetek

Lek Erdomed Muko – działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Odnotowano następujące działania niepożądane:

- Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów): ból w nadbrzuszu, nudności, ból głowy.
- Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów): zgaga, zaparcie, biegunka, suchość jamy ustnej, zawroty głowy, ogólne złe samopoczucie.
- Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): brak odczuwania smaku lub zaburzenia smaku, objawy alergii: wysypka, pokrzywka, gorączka.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Erdomed Muko mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Erdomed Muko – jak przechowywać?

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa
tel. (22) 70 28 200
email: angelini@angelini.pl

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

ERDOMED[®]MUKO

zawiera **erdosteinę - najnowszą substancję leczniczą** o szerokim spektrum działania.



Ułatwia usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych



Zmniejsza intensywność kaszlu



Minimalizuje ryzyko rozwoju infekcji bakteryjnej



Działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie



*IQVIA, Database, ROSC, 2020

EM65/1/21

Dawkowanie ERDOMED[®]MUKO



Dorośli
1 saszетка 2-3 x na dobę



Dzieci > 12 r.ż.
1 saszетка 2 x na dobę

Jak przygotować Erdomed Muko?

Zawartość saszetki rozpuścić w pół szklanki (120 ml) wody o temperaturze pokojowej.



lek OTC
EM65/1/21

Erdosteina to **PROLEK**, który nie wywiera wpływu na błonę śluzową żołądka.



BEZPIECZNY DLA ŻOŁĄDKA

Może być bezpiecznie stosowany u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy*.

*Kubiś A., Formál R., Kuratova R., Zastosowanie erdosteiny w codziennej praktyce lekarskiej, Świat Medycyny i Farmacji, 2019, 12, 35-34



EM65/1/21

Kiedy stosować ERDOMED[®]MUKO

Leczenie wspomagające w:

w ostrej infekcjach górnych dróg oddechowych: nosa, zatok przynosowych, krtań z nadmiernym wydzielaniem śluzu.

w ostrej infekcjach dolnych dróg oddechowych: tchawicy, oskrzeli, płuc z nadmiernym wydzielaniem śluzu.




w przewlekłych infekcjach górnych i dolnych dróg oddechowych z nadmiernym wydzielaniem śluzu.

*CZLP Erdomed Muko
EM65/1/21

ERDOMED[®]MUKO

dostępny w dwóch wariantach opakowania



10 saszetek

1 opakowanie wystarczy na 1 pełną terapię



EM65/1/21