

Etodal, 0,1 g/g żel, 50 g

Cena: 27,69 zł

Opis słownikowy

Marka	Etodal
Postać	żel
Producent	Ziaja
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Etofenamat

Opis produktu

Skład Etodal, 0,1 g/g żel, 50 g

1 g żelu zawiera 100 mg etofenamatu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy.

Wskazania Etodal, 0,1 g/g żel, 50 g

Etodal jest produktem leczniczym wskazanym w leczeniu:

- tępych urazów, takich jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów;
- chorób zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych;
- reumatyzmu pozastawowego:

bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej,

zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki maziowej,

ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych (tzw. staw zamrożony),

zapalenie nadkłykci.

Etodal jest wskazany do stosowania u dorosłych.

Dawkowanie Etodal, 0,1 g/g żel, 50 g

Żel należy nałożyć na obszar dotknięty bólem i delikatnie wcierać aż do całkowitego wchłonięcia się produktu leczniczego. W zależności od wielkości obszaru objętego bólem, należy zastosować pasek produktu leczniczego Etodal długości 5 do 10 cm (co odpowiada około 1,7 do 3,3 g). Etodal należy stosować maksymalnie 3 do 4 razy na dobę.

Leczenie dolegliwości reumatycznych trwa zazwyczaj 3 do 4 tygodni, zaś tępych urazów (np. urazów sportowych) - do 2 tygodni.

Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają w dowolnym momencie, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania

Podanie na skórę.

Przeciwwskazania Etodal, 0,1 g/g żel, 50 g

Produktu leczniczego Etodal nie należy stosować:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;
- w trzecim trymestrze ciąży

Informacje dodatkowe Etodal, 0,1 g/g żel, 50 g

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.