

## Fenistil, 1 mg/g żel, 30 g (import równoległy, Delfarma)

Cena: 31,19 zł

### Opis słownikowy

Marka	Fenistil
Postać	żel
Producent	Delfarma
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Dimetinden



### Opis produktu

### Informacje podstawowe Fenistil, 1 mg/g żel, 30 g (import równoległy, Delfarma)

Lek Fenistil ma postać żelu do stosowania na skórę. Lek stosowany na skórę działa miejscowo przeciwozuczekowo, silnie przeciwiświądowo (z wyłączeniem świądu cholestatycznego), zmniejsza obrzęk, łagodzi podrażnienia.

### Skład Fenistil, 1 mg/g żel, 30 g (import równoległy, Delfarma)

Substancj? czynn? leku jest dimetyndenu maleinian (*Dimetindeni maleas*).

Jeden gram ?elu zawiera 1 mg dimetyndenu maleinianu

Substancje pomocnicze: benzalkomowy chlorek, sodu wersenlan, karbomer (karbopol 974 P), sodu wodorotlenek 30%, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

### Działanie Fenistil, 1 mg/g żel, 30 g (import równoległy, Delfarma)

Fenistil zawiera substancję czynną dimetyndenu maleinian, który hamuje działanie histaminy - związku odpowiedzialnego za reakcje alergiczne.

Lek stosowany na skórę działa miejscowo przeciwuczuleniowo, silnie przeciwświądowo (z wyłączeniem świądu cholestatycznego), zmniejsza obrzęk, łagodzi podrażnienia. Wykazuje miejscowe właściwości znieczulające. Chłodzi, co dodatkowo łagodzi podrażnioną skórę.

## Wskazania Fenistil, 1 mg/g żel, 30 g (import równoległy, Delfarma)

Lek Fenistil jest stosowany w przypadku świądu skóry towarzyszącemu:

pokrzywce,  
ukąszeniach owadów,  
oparzeniach słonecznym,  
oparzeniach pierwszego stopnia.

## Dawkowanie Fenistil, 1 mg/g żel, 30 g (import równoległy, Delfarma)

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Zwykle, o ile lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować 2 do 4 razy na dobę, pokrywając cienką warstwą żelu zmienioną chorobowo i swędzącą powierzchnię skóry.

## Przeciwwskazania Fenistil, 1 mg/g żel, 30 g (import równoległy, Delfarma)

Kiedy nie stosować leku Fenistil:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;  
w przypadku oparzeń drugiego i trzeciego stopnia.

## Informacje dodatkowe Fenistil, 1 mg/g żel, 30 g (import równoległy, Delfarma)

### Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Suchość skóry,  
Uczucie pieczenia skóry,  
Skórne reakcje alergiczne obejmujące wysypkę i swędzenie skóry.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku stosowania leku Fenistil na rozległą powierzchnię skóry, należy unikać ekspozycji miejsc nim pokrytych na działanie promieni słonecznych.

Lek Fenistil zawiera:

glikol propylenowy - lek może powodować podrażnienie skóry.  
chlórek benzalkoniowy - lek podrażnia, może powodować reakcje skórne.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Chronić od światła.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym niedostępnym dla dzieci.

**Stosowanie innych leków**

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

**Ciąża i karmienie piersią**

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

**Stosowanie leku u dzieci i młodzieży**

Należy unikać stosowania leku u małych dzieci na duże powierzchnie skóry, zwłaszcza w przypadkach zranień, oparzeń i stanów zapalnych skóry.

**Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn**

Fenistil stosowany na skórę nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych